

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5080, 5.4.2018
Αριθμός 91

Κ.Δ.Π. 91/2018

Οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 14 του περί Σπόρων Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(Ι) του 2010).

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1998 ΕΩΣ 2012

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 14

Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.: L 327,
2.12.2016,
σ. 59.

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2016/2109 της Επιτροπής της 1ης Δεκεμβρίου 2016 για την τροποποίηση της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προσθήκη νέων ειδών και τη βοτανική ονομασία του είδους *Lolium x boucheanum* Kunth (λόλιον το υβρίδιο)».

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτό από το άρθρο 14 του περί Σπόρων Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς.

63(Ι) του 1998
173(Ι) του 2002
173(Ι) του 2007
61(Ι) του 2012.

Συνοπτικός
τίτλος.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
27.9.2002
15.4.2005
10.2.2006
5.12.2008
22.10.2010
7.2.2014
30.6.2017.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) Κανονισμούς του 2002 έως 2017 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) Κανονισμοί του 2002 έως 2018.

Τροποποίηση του
Παραρτήματος ΙΙ των
βασικών κανονισμών.

2. Το Παράρτημα ΙΙ των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (1) του Μέρους Ι αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (1):

«(1) Οι σπόροι προς σπορά πρέπει να έχουν επαρκή ταυτότητα και καθαρότητα της ποικιλίας. Ειδικότερα η ελάχιστη ποικιλιακή καθαρότητα των πιστοποιημένων σπόρων των πιο κάτω ειδών πρέπει να είναι:

α/α	Είδη / Κατηγορία Σπόρου	Ποικιλιακή καθαρότητα (%)
	1	2
(α)	- <i>Poa pratensis</i> (ποικιλίες που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (γ) της παραγράφου (4) του Παραρτήματος Ι), <i>Brassica napus</i> var. <i>napobrassica</i> , <i>Brassica oleracea</i> conv. <i>acephala</i>	98%
(β)	- <i>Pisum sativum</i> , <i>Vicia faba</i> : - πιστοποιημένοι σπόροι πρώτης γενεάς - πιστοποιημένοι σπόροι δεύτερης γενεάς και επόμενων γενεών	99% 98%
(γ)	<i>Trifolium subterraneum</i> , <i>Medicago</i> spp., εκτός από <i>M. lupulina</i> , <i>M. sativa</i> , <i>M.x varia</i> : - για την παραγωγή βασικών σπόρων προς σπορά - για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων για περαιτέρω πολλαπλασιασμό - για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων	99,5% 98% 95%

Η ελάχιστη καθαρότητα της ποικιλίας ελέγχεται κυρίως με επιτόπου επιθεωρήσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι.»

Πρώτος Πίνακας. (β) με την αντικατάσταση του πίνακα Α, του σημείου (Α), της παραγράφου (2) του Μέρους Ι, με το νέο πίνακα Α που εκτίθεται στον Πρώτο Πίνακα.

(γ) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ε) του σημείου (Β), της παραγράφου (2) του Μέρους Ι, με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο:

«(ε) Ολική ανώτατη περιεκτικότητα σε ποσοστό μισό τοις εκατό (0,5%) σε βάρος σπόρων *Lupinus albus*, *Lupinus angustifolius*, *Lupinus luteus*, *Pisum sativum*, *Vicia faba*, *Vicia* spp. σε ένα άλλο συγγενικό είδος δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας».

Δεύτερος Πίνακας. (δ) με την αντικατάσταση του πίνακα Β, του σημείου (Α), της παραγράφου (2), του Μέρους ΙΙ, με το νέο πίνακα Β που εκτίθεται στον Δεύτερο Πίνακα.

(ε) με την αντικατάσταση των παραγράφων (7) και (8) του Μέρους ΙΙΙ, με τις ακόλουθες νέες παραγράφους:

«(7) Για τα είδη *Vicia*, ολική ανώτατη περιεκτικότητα σε ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) κατά βάρος των σπόρων *Vicia rannonica*, *Vicia villosa*, *Vicia benghalensis* ή συγγενικών καλλιεργούμενων ειδών σε άλλο αντίστοιχο είδος δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας».

(8) Η ελάχιστη αναλυτική καθαρότητα για τα είδη *Vicia rannonica*, *Vicia sativa*, *Vicia villosa*, *Vicia benghalensis* είναι σε ποσοστό ενενήντα επτά τοις εκατό (97%) κατά βάρος».

(στ) με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (8) του Μέρους ΙΙΙ, της ακόλουθης νέας παραγράφου (9):

«(9) Για το είδος *Lathyrus cicera* η ελάχιστη αναλυτική καθαρότητα είναι σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) κατά βάρος. Ολική ανώτατη περιεκτικότητα σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) κατά βάρος των σπόρων παρόμοιων καλλιεργούμενων ειδών δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας.».

Αντικατάσταση του Παραρτήματος ΙΙΙ των βασικών κανονισμών. Τρίτος Πίνακας.

3. Το Παράρτημα ΙΙΙ των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται με το νέο Παράρτημα ΙΙΙ που εκτίθεται στον Τρίτο Πίνακα.

Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙV των βασικών κανονισμών.

4. Το Παράρτημα ΙV των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση, στη στήλη 1, της καταχώρησης με αύξων αριθμό 18, της φράσης «*Lolium × boucheanum*», με τη φράση «*Lolium × hybridum* Hausskn».

Αντικατάσταση του Παραρτήματος V των βασικών κανονισμών. Τέταρτος Πίνακας.

5. Το Παράρτημα V των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται με το νέο Παράρτημα V που εκτίθεται στον Τέταρτο Πίνακα.

Πρώτος Πίνακας
«(Α) ΠΙΝΑΚΑΣ Α: Κανόνες και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται για τους Πιστοποιημένους σπόρους

α/α	Είδη	Βλαστική Ικανότητα		Αναλυτική καθαρότητα								Ανώτατη περιεκτικότητα σε σπόρους άλλων ειδών φυτών (% βάρους)			Ανώτατη περιεκτικότητα σε σπόρους άλλων ειδών φυτών σε δείγμα βάρους προβλεπόμενο στη στήλη 4 του Παραρτήματος V των Κανονισμών αυτών			Όροι που αφορούν την περιεκτικότητα σε σπόρους του <i>Lupinus spp</i> άλλου χρώματος και σε σπόρους πικρού λούπινου
		Ελάχιστη βλαστική ικανότητα (% των καθαρών σπόρων)	Ανώτατη περιεκτικότητα σε σκληρούς σπόρους (% των καθαρών σπόρων)	Ελάχιστη αναλυτική καθαρότητα (% του βάρους)	Ανώτατη περιεκτικότητα σε σπόρους							<i>Avena fatua</i> , <i>Avena sterilis</i>	<i>Cuscuta spp.</i>	<i>Rumex spp.</i> , πλήν των <i>Rumex acetosella</i> και <i>Rumex maritimus</i>				
					Ολική	Ένα μόνο είδος	<i>Elytrigia repens</i>	<i>Alopecurus myosuroides</i>	<i>Melilotus spp.</i>	<i>Raphanus raphanistrum</i>	<i>Sinapis arvensis</i>				12	13	14	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	<u>Poaceae</u> <u>(Gramineae)</u> <u>Ανροστώδη</u>																	
1	<i>Agrostis canina</i>	75(α)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (ι)(κ)	2(ν)				
2	<i>Agrostis capillaris</i>	75(α)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (ι)(κ)	2(ν)				
3	<i>Agrostis gigantea</i>	80(α)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (ι)(κ)	2(ν)				
4	<i>Agrostis stolonifera</i>	75(α)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (ι)(κ)	2(ν)				
5	<i>Alopecurus pratensis</i>	70(α)		75	2,5	1,0(στ)	0,3	0,3				0	0 (ι)(κ)	5(ν)				
6	<i>Arrhenatherum elatius</i>	75(α)		90	3,0	1,0(στ)	0,5	0,3				0 (ζ)	0 (ι)(κ)	5(ν)				

7	Bromus catharticus	75(α)		97	1,5	1,0	0,5	0,3					0 (ζ)	0 (ι)(κ)	10(ν)	

25	Poa nemoralis	75(α)		85	2,0(ν)	1,0(ν)	0,3						0	0 (ι)(κ)	2(ν)	
26	Poa palustris	75(α)		85	2,0(ν)	1,0(ν)	0,3						0	0 (ι)(κ)	2(ν)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
27	Poa pratensis	75(α)		85	2,0(ν)	1,0(ν)	0,3					0	0 (ι)(κ)	2(ν)		
28	Poa trivialis	75(α)		85	2,0(ν)	1,0(ν)	0,3					0	0 (ι)(κ)	2(ν)		
29	Trisetum flavescens	70(α)		75	3,0	1,0(στ)	0,3					0(η)	0 (ι)(κ)	2(ν)		
	Fabaceae (Leguminosae) ΨΥΧΑΝΘΗ															
30	Biserula pelecinus	70		98	0,5							0(θ)	0 (ι)(κ)	10		
31	Galega orientalis	60(α)(β)	40	97	2,0	1,5			0,3			0	0(λ)(μ)	10(ν)		
32	Hedysarum coronarium	75(α)(β)	30	95	2,5	1,0			0,3			0	0(κ)	5		
33	Lathyrus cicera	80		95	1	0,5			0,3			0(θ)	0 (ι)(κ)	20		
34	Lotus corniculatus	75(α)(β)	40	95	1,8(δ)	1,0(δ)			0,3			0	0(λ)(μ)	10		
35	Lupinus albus	80(α)(β)	20	98	0,5(ε)	0,3(ε)			0,3			0(θ)	0(ι)	5(ν)	(ξ)(ο)	
36	Lupinus angustifolius	75(α)(β)	20	98	0,5(ε)	0,3(ε)			0,3			0(θ)	0(ι)	5(ν)	(ξ)(ο)	
37	Lupinus luteus	80(α)(β)	20	98	0,5(ε)	0,3(ε)			0,3			0(θ)	0(ι)	5(ν)	(ξ)(ο)	
38	Medicago doliata	70		98	2							0(θ)	0 (ι)(κ)	10		
39	Medicago italica	70(β)	20	98	2							0(θ)	0 (ι)(κ)	10		
40	Medicago litoralis	70		98	2							0(θ)	0 (ι)(κ)	10		
41	Medicago lupulina	80(α)(β)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0(λ)(μ)	10		

42	Medicago murex	70(β)	30	98	2										0(θ)	0(ι)(κ)	10	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
43	Medicago polymorpha	70(β)	30	98	2							0(θ)	0(ι)(κ)	10				
44	Medicago rugosa	70(β)	20	98	2							0(θ)	0(ι)(κ)	10				
45	Medicago sativa	80(α)(β)	40	97	1,5	1,0			0,3			0	0(λ)(μ)	10				
46	Medicago scutellata	70		98	2							0(θ)	0(ι)(κ)	10				
47	Medicago truncatula	70(β)	20	98	2							0(θ)	0(ι)(κ)	10				
48	Medicago x varia	80(α)(β)	40	97	1,5	1,0			0,3			0	0(λ)(μ)	10				
49	Onobrychis viciifolia	75(α)(β)	20	95	2,5	1,0			0,3			0	0(ι)	5				
50	Ornithopus compressus	75		90	1							0(θ)	0(ι)(κ)	10				
51	Ornithopus sativus	75		90	1							0(θ)	0(ι)(κ)	10				
52	Pisum sativum	80(α)		98	0,5	0,3			0,3			0	0(ι)	5(ν)				
53	Trifolium alexandrinum	80(α)(β)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0(λ)(μ)	10				
54	Trifolium fragiferum	75		98	1							0(θ)	0(ι)(κ)	10				
55	Trifolium glanduliferum	70(β)	30	98	1							0(θ)	0(ι)(κ)	10				
56	Trifolium hirtum	70		98	1							0(θ)	0(ι)(κ)	10				
57	Trifolium hybridum	80(α)(β)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0(λ)(μ)	10				

58	Trifolium incarnatum	75(α)(β)	20	97	1,5	1,0				0,3					0	0(λ)(μ)	10	
59	Trifolium isthmocarpum	70		98	1										0(θ)	0 (ι)(κ)	10	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
60	Trifolium michelianum	75(β)	30	98	1							0(θ)	0 (ι)(κ)	10				
61	Trifolium pratense	80(α)(β)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0(λ)(μ)	10				
62	Trifolium repens	80(α)(β)	40	97	1,5	1,0			0,3			0	0(λ)(μ)	10				
63	Trifolium resupinatum	80(α)(β)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0(λ)(μ)	10				
64	Trifolium squarrosum	75(β)	20	97	1,5				0,3			0	0(λ)(μ)	10				
65	Trifolium subterraneum	80(β)	40	97	0,5							0(θ)	0 (ι)(κ)	10				
66	Trifolium vesiculosum	70		98	1							0(θ)	0 (ι)(κ)	10				
67	Trigonella foenum-graecum	80(α)		95	1,0	0,5			0,3			0	0(ι)	5				
68	Vicia benghalensis	80(β)	20	97(ε)	1							0(θ)	0 (ι)(κ)	10				
69	Vicia faba	80(α)(β)	5	98	0,5	0,3			0,3			0	0(ι)	5(ν)				
70	Vicia pannonica	85(α)(β)	20	98	1,0(ε)	0,5(ε)			0,3			0(θ)	0(ι)	5(ν)				
71	Vicia sativa	85(α)(β)	20	98	1,0(ε)	0,5(ε)			0,3			0(θ)	0(ι)	5(ν)				
72	Vicia villosa	85(α)(β)	20	98	1,0(ε)	0,5(ε)			0,3			0(θ)	0(ι)	5(ν)				
	Άλλα είδη																	
73	Brassica napus var.	80(α)		98	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0(ι)(κ)	5				

Δεύτερος Πίνακας
«(Α) ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Κανόνες και προϋποθέσεις που πρέπει να εφαρμόζονται για τους Βασικούς σπόρους

α/α	Είδη	Ανώτατη περιεκτικότητα σε σπόρους άλλων ειδών φυτών						Λοιτοί κανόνες ή προϋποθέσεις
		Σύνολο (% του βάρους)	Περιεκτικότητα σε αριθμό, σε δείγμα βάρους που προβλέπεται στη στήλη 4 του Παραρτήματος V των Κανονισμών αυτών					
			Ένα μόνο είδος	<i>Rumex</i> spp. πλην του <i>Rumex acetosella</i> και <i>Rumex maritimus</i>	<i>Elytrigia repens</i>	<i>Alopecurus myosuroides</i>	<i>Melilotus</i> spp.	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Poaceae (Gramineae)</u> <u>Αγροστώδη</u>							
1	Agrostis canina	0,3	20	1	1	1		(ι)
2	Agrostis capillaris	0,3	20	1	1	1		(ι)
3	Agrostis gigantea	0,3	20	1	1	1		(ι)
4	Agrostis stolonifera	0,3	20	1	1	1		(ι)
5	Alopecurus pratensis	0,3	20(α)	2	5	5		(ι)
6	Arrhenatherum elatius	0,3	20(α)	2	5	5		(θ) (ι)
7	Bromus catharticus	0,4	20	5	5	5		(ι)
8	Bromus sitchensis	0,4	20	5	5	5		(ι)
9	Cynodon dactylon	0,3	20(α)	1	1	1		(ι)
10	Dactylis glomerata	0,3	20(α)	2	5	5		(ι)
11	Festuca arundinacea	0,3	20(α)	2	5	5		(ι)

	1	2	3	4	5	6	7	8
12	Festuca filiformis	0,3	20(α)	2	5	5		(ι)
13	Festuca ovina	0,3	20(α)	2	5	5		(ι)
14	Festuca pratensis	0,3	20(α)	2	5	5		(ι)
15	Festuca rubra	0,3	20(α)	2	5	5		(ι)
16	Festuca trachyphylla	0,3	20(α)	2	5	5		(ι)
17	x Festulolium	0,3	20(α)	2	5	5		(ι)
18	Lolium multiflorum	0,3	20(α)	2	5	5		(ι)
19	Lolium perenne	0,3	20(α)	2	5	5		(ι)
20	Lolium x hybridum	0,3	20(α)	2	5	5		(ι)
21	Phalaris aquatica	0,3	20	2	5	5		(ι)
22	Phleum nodosum	0,3	20	2	1	1		(ι)
23	Phleum pratense	0,3	20	2	1	1		(ι)
24	Poa annua	0,3	20(β)	1	1	1		(στ) (ι)
25	Poa nemoralis	0,3	20(β)	1	1	1		(στ) (ι)
26	Poa palustris	0,3	20(β)	1	1	1		(στ) (ι)
27	Poa pratensis	0,3	20(β)	1	1	1		(στ) (ι)
28	Poa trivialis	0,3	20(β)	1	1	1		(στ) (ι)
29	Trisetum flavescens	0,3	20(γ)	1	1	1		(θ) (ι)
	Fabaceae (Leguminosae) Ψυχανθή							

	1	2	3	4	5	6	7	8
30	Biserrula pelecinus	0,3	20	5				
31	Galega orientalis	0,3	20	2			0(ε)	(ι)
32	Hedysarum coronarium	0,3	20	2			0(ε)	(ι)
33	Lathyrus cicera	0,3	20	5	–	–	0(δ)	
34	Lotus corniculatus	0,3	20	3			0(ε)	(ζ) (ι)
35	Lupinus albus	0,3	20	2			0(δ)	(η) (κ)
36	Lupinus angustifolius	0,3	20	2			0(δ)	(η) (κ)
37	Lupinus luteus	0,3	20	2			0(δ)	(η) (κ)
38	Medicago dolia	0,3	20	5	–	–	0(ε)	
39	Medicago italica	0,3	20	5	–	–	0(ε)	
40	Medicago littoralis	0,3	20	5	–	–	0(ε)	
41	Medicago lupulina	0,3	20	5	–	–	0(ε)	(ι)
42	Medicago murex	0,3	20	5	–	–	0(ε)	
43	Medicago polymorpha	0,3	20	5	–	–	–	
44	Medicago rugosa	0,3	20	5	–	–	–	
45	Medicago sativa	0,3	20	3			0(ε)	(ι)
46	Medicago scutellata	0,3	20	5				
47	Medicago truncatula	0,3	20	5				
48	Medicago x varia	0,3	20	3			0(ε)	(ι)

	1	2	3	4	5	6	7	8
49	Onobrychis vicifolia	0,3	20	2			0(δ)	
50	Ornithopus compressus	0,3	20	5				
51	Ornithopus sativus	0,3	20	5				
52	Pisum sativum	0,3	20	2			0(δ)	
53	Trifolium alexandrinum	0,3	20	3			0(ε)	(ι)
54	Trifolium fragiferum	0,3	20	5				
55	Trifolium glanduliferum	0,3	20	5				
56	Trifolium hirtum	0,3	20	5				
57	Trifolium hybridum	0,3	20	3			0(ε)	(ι)
58	Trifolium incarnatum	0,3	20	3			0(ε)	(ι)
59	Trifolium isthmocarpum	0,3	20	5	–	–	–	(ι)
60	Trifolium michelianum	0,3	20	5	–	–	–	–
61	Trifolium pratense	0,3	20	5			0(ε)	(ι)
62	Trifolium repens	0,3	20	5			0(ε)	(ι)
63	Trifolium resupinatum	0,3	20	3			0(ε)	(ι)
64	Trifolium squarrosum	0,3	20	5	–	–	–	–
65	Trifolium subterraneum	0,3	20	5	–	–	–	(ι)
66	Trifolium vesiculosum	0,3	20	5	–	–	–	(ι)
67	Trigonella foenum-graecum	0,3	20	2			0(δ)	

	1	2	3	4	5	6	7	8
68	Vicia benghalensis	0,3	20	5	–	–	0(6)	–
69	Vicia faba	0,3	20	2			0(6)	
70	Vicia pannonica	0,3	20	2			0(6)	(η)
71	Vicia sativa	0,3	20	2			0(6)	(η)
72	Vicia villosa	0,3	20	2			0(6)	(η)
	<u>Άλλα είδη</u>							
73	Brassica napus var. napobrassica	0,3	20	2				(ι)
74	Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)	0,3	20	3				(ι)
75	Phacelia tanacetifolia	0,3	20					
76	Plantago lanceolata	0,3	20	3				
77	Raphanus sativus var. oleiformis	0,3	20	2				

»

Τρίτος Πίνακας**« ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
(Κανονισμός 2)****ΕΙΔΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ**

Λατινική ονομασία	Ελληνική ονομασία
(α) Poaceae (Gramineae)	Αγροστώδη
Agrostis canina L.	Ψευδαγρώστις, Αγρώστις του κυνός
Agrostis gigantea Roth	Ψευδαγρώστις, Αγρώστις η λευκή
Agrostis stolonifera L.	Ψευδαγρώστις, Αγρώστις η σπονδυλωτή
Agrostis capillaris L.	Ψευδαγρώστις, Αγρώστις η λεπτή
Alopecurus pratensis L.	Αλωπέκουρος ο λειμώνιος
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl	Βρώμη η υψηλή (Fromental)
Bromus catharticus Vahl	Βρώμος
Bromus sitchensis Trin.	Βρώμος της Αλάσκας
Cynodon dactylon (L.) Pers.	Αγριάδα
Dactylis glomerata L.	Δακτυλίδα ή Δακτυλίσ η συνεσπειρώμενη
Festuca arundinacea Schreber	Φεστούκα η καλαμοειδής
Festuca filiformis Pourr	Φεστούκα η τριχοειδής
Festuca ovina L.	Φεστούκα η κτηνοτροφική
Festuca pratensis Huds.	Φεστούκα η λειμώνια
Festuca rubra L.	Φεστούκα η ερυθρά
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina	Φεστούκα η κτηνοτροφική
Lolium multiflorum Lam	Λόλιο το Ιταλικό (περιλαμβανομένου και του Westerwold)
Lolium perenne L.	Λόλιο το πολυετές
Lolium x hybridum Hausskn	Λόλιο το υβρίδιον
Phalaris aquatica L.	Φάλαρις (σκληρό γρασίδι) Harting grass
Phleum nodosum L.	Φλέως ο λειμώνιος
Phleum pratense L.	Φλέως ο λειμώνιος
Poa annua L.	Πόα η ετήσια

Poa nemoralis L.	Πόα η δασική
Poa palustris L.	Πόα η βαλτάσης
Poa pratensis L.	Πόα η λειμώνιος
Poa trivialis L.	Πόα η κοινή
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.	Κιτρινωπή βρώμη
Ο ορισμός αυτός καλύπτει επίσης τα ακόλουθα υβρίδια τα οποία προκύπτουν από τη διασταύρωση των προαναφερθέντων ειδών:	
X Festulolium Asch. & Graebn.	Υβρίδια που προκύπτουν από τη διασταύρωση ενός είδους του γένους <i>Festuca</i> με ένα είδος του γένους <i>Lolium</i>
(β) Fabaceae (Leguminosae)	Ψυχανθή
Biserrula pelecinus L.	Βισερούλα η πελέκινη
Galega orientalis Lam.	Κτηνοτροφικό φυτό Galega
Hedysarum coronarium L.	Ηδύσαρυν το στεφανοφόρον
Lathyrus cicera L.	Λάθυρος ο ερέβινθος (κτηνοτροφικό λαθούρι)
Lotus corniculatus L.	Λωτός ο κερατιοφόρος (λοτός)
Lupinus albus L.	Λούπινο το λευκό
Lupinus angustifolius L.	Λούπινο το στενόφυλλο
Lupinus luteus L.	Λούπινο το κίτρινο
Medicago doliata Carmign.	Μηδική η ακανθώδης
Medicago italica (Mill.) Fiori	Μηδική η ιταλική
Medicago littoralis Rohde ex Loisel.	Μηδική η παράλιος
Medicago lupulina L.	Μηδική η Λυκίσκη
Medicago murex Willd.	Μηδική η σφαιρόκαρπος
Medicago polymorpha L.	Μηδική η πολύμορφη
Medicago rugosa Desr.	Μηδική η ρικνή
Medicago sativa L.	Μηδική η ήμερος
Medicago scutellata (L.) Mill.	Μηδική η πινακοειδής
Medicago truncatula Gaertn.	Μηδική η βαρελωτή
Medicago x varia T. Martyn Sand	Μηδική ποικιλόστικτη
Onobrychis vicifolia Scop.	Ονοβρυχίδα η ήμερος
Ornithopus compressus L.	Ορνιθόπους ο πεπλατυσμένος

<i>Ornithopus sativus</i> Brot.	Ορνιθόπους ο βρώσιμος
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Κτηνοτροφικό μπιζέλι
<i>Trifolium alexandrinum</i> L.	Τριφύλλι το αλεξανδρινό
<i>Trifolium fragiferum</i> L.	Τριφύλλι το χαμαικέρασο
<i>Trifolium glanduliferum</i> Boiss.	Τριφύλλι το αδενικό
<i>Trifolium hirtum</i> All.	Τριφύλλι το ροδόχρουν
<i>Trifolium hybridum</i> L.	Τριφύλλι το νόθο
<i>Trifolium incarnatum</i> L.	Τριφύλλι το σαρκόχρουν
<i>Trifolium isthmocarpum</i> Brot.	Τριφύλλι το μαροκινό
<i>Trifolium michelianum</i> Savi	Τριφύλλι Balansa
<i>Trifolium pratense</i> L.	Τριφύλλι το λειμώνιο (κόκκινο τριφύλλι)
<i>Trifolium repens</i> L.	Τριφύλλι το έρπον
<i>Trifolium resupinatum</i> L.	Τριφύλλι το ύπτιο (τριφύλλι Περσίας)
<i>Trifolium squarrosum</i> L.	Τριφύλλι Squarrose
<i>Trifolium subterraneum</i> L.	Τριφύλλι το υπόγειο
<i>Trifolium vesiculosum</i> Savi	Τριφύλλι το κυστώδες
<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.	Μοσχοσίταρο (Τριγωνέλλα η ελληνική)
<i>Vicia benghalensis</i> L.	Βίκος ο ιώδης
<i>Vicia faba</i> L.	Κτηνοτροφικό κουκί
<i>Vicia pannonica</i> Crantz	Βίκος ο Ουγγρικός
<i>Vicia sativa</i> L.	Βίκος ο κοινός (κτηνοτροφικός)
<i>Vicia villosa</i> Roth	Βίκος ο άγριος ή Λάνα
(γ) Άλλα είδη	
<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.	Κράμβη (Ελαιοκράμβη)
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC) Alef. var. <i>medullosa</i> Thell. var. <i>viridis</i> L.	Κτηνοτροφικό κραμπί
<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.	Φακελωτή
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Πλάνταγκο το λογχοειδές
<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.	Ελαιοφόρο Ραπάνι»

Τέταρτος Πίνακας

« ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

(Κανονισμός 7)

ΒΑΡΟΣ ΣΠΟΡΟΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

α/α	Είδη	Ανώτατο βάρος σπορομερίδας (τόνοι)	Ελάχιστο βάρος ενός δείγματος που πρέπει να ληφθεί από κάθε σπορομερίδα (γραμμάρια)	Βάρος δείγματος για τις μετρήσεις που προβλέπονται στις στήλες 12 μέχρι 14 του Πίνακα Α και στις στήλες 3 μέχρι 7 του Πίνακα Β του Παραρτήματος II
	1	2	3	4
	<u>Αγροστώδη</u>			
1.	<i>Agrostis canina</i>	10	50	5
2.	<i>Agrostis capillaris</i>	10	50	5
3.	<i>Agrostis gigantea</i>	10	50	5
4.	<i>Agrostis stolonifera</i>	10	50	5
5.	<i>Alopecurus pratensis</i>	10	100	30
6.	<i>Arrhenatherum elatius</i>	10	200	80
7.	<i>Bromus catharticus</i>	10	200	200
8.	<i>Bromus sitchensis</i>	10	200	200
9.	<i>Cynodon dactylon</i>	10	50	5
10.	<i>Dactylis glomerata</i>	10	100	30
11.	<i>Festuca arundinacea</i>	10	100	50
12.	<i>Festuca filiformis</i>	10	100	30
13.	<i>Festuca ovina</i>	10	100	30
14.	<i>Festuca pratensis</i>	10	100	50
15.	<i>Festuca rubra</i>	10	100	30
16.	<i>Festuca trachyphylla</i>	10	100	30
17.	x <i>Festulolium</i>	10	200	60
18.	<i>Lolium multiflorum</i>	10	200	60

19.	<i>Lolium perenne</i>	10	200	60
20.	<i>Lolium x hybridum</i>	10	200	60
21.	<i>Phalaris aquatica</i>	10	100	50
22.	<i>Phleum nodosum</i>	10	50	10
23.	<i>Phleum pratense</i>	10	50	10
24.	<i>Poa annua</i>	10	50	10
25.	<i>Poa nemoralis</i>	10	50	5
26.	<i>Poa palustris</i>	10	50	5
27.	<i>Poa pratensis</i>	10	50	5
28.	<i>Poa trivialis</i>	10	50	5
29.	<i>Trisetum flavescens</i>	10	50	5
	<u>Ψυχανθή</u>			
30.	<i>Biserrula pelecinis</i>	10	30	3
31.	<i>Galega orientalis</i>	10	250	200
32.	<i>Hedysarum coronarium</i> :			
	- καρπός	10	1000	300
	- σπόρος	10	400	120
33.	<i>Lathyrus cicera</i>	25	1000	140
34.	<i>Lotus corniculatus</i>	10	200	30
35.	<i>Lupinus albus</i>	30	1000	1000
36.	<i>Lupinus angustifolius</i>	30	1000	1000
37.	<i>Lupinus luteus</i>	30	1000	1000
38.	<i>Medicago doliata</i>	10	100	10
39.	<i>Medicago italica</i>	10	100	10
40.	<i>Medicago littoralis</i>	10	70	7
41.	<i>Medicago lupulina</i>	10	300	50
42.	<i>Medicago murex</i>	10	50	5
43.	<i>Medicago polymorpha</i>	10	70	7
44.	<i>Medicago rugosa</i>	10	180	18
45.	<i>Medicago sativa</i>	10	300	50
46.	<i>Medicago scutellata</i>	10	400	40

47.	Medicago truncatula	10	100	10
48.	Medicago x varia	10	300	50
49.	Onobrychis viciifolia:			
	- καρπός	10	600	600
	- σπόρος	10	400	400
50.	Ornithopus compressus	10	120	12
51.	Ornithopus sativus	10	90	9
52.	Pisum sativum	30	1000	1000
53.	Trifolium alexandrinum	10	400	60
54.	Trifolium fragiferum	10	40	4
55.	Trifolium glanduliferum	10	20	2
56.	Trifolium hirtum	10	70	7
57.	Trifolium hybridum	10	200	20
58.	Trifolium incarnatum	10	500	80
59.	Trifolium isthmocarpum	10	100	3
60.	Trifolium michelianum	10	25	2
61.	Trifolium pratense	10	300	50
62.	Trifolium repens	10	200	20
63.	Trifolium resupinatum	10	200	20
64.	Trifolium squarrosum	10	150	15
65.	Trifolium subterraneum	10	250	25
66.	Trifolium vesiculosum	10	100	3
67.	Trigonella foenum-graecum	10	500	450
68.	Vicia benghalensis	20	1000	120
69.	Vicia faba	30	1000	1000
70.	Vicia pannonica	30	1000	1000
71.	Vicia sativa	30	1000	1000
72.	Vicia villosa	30	1000	1000
	<u>Άλλα είδη</u>			
73.	Brassica napus	10	200	100

	var.napobrassica			
74.	Brassica oleracea convar. acephala	10	200	100
75.	Phacelia tanacetifolia	10	300	40
76.	Plantago lanceolata	5	20	2
77.	Raphanus sativus var. oleiformis	10	300	300

Επιτρέπεται ανοχή μέχρι πέντε τοις εκατό (5%) επί του μέγιστου βάρους μιας σπορομερίδας σπόρων προς σπορά.

»