

Αριθμός 246

ΟΙ ΠΕΡΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
(ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ)
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2002, ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
(ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2001

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 30 του Νόμου και του Κανονισμού 39
Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
τίτλο—

«Απόφαση της Επιτροπής 95/274/ΕΚ της 10.7.1995,
Απόφαση της Επιτροπής 2000/285/ΕΚ της 5.4.2000,
Απόφαση του Συμβουλίου 2000/276/ΕΚ της 4.12.2001,
Απόφαση της Επιτροπής 2001/9/ΕΚ της 29.12.2000,
και τις εξής τροποποιήσεις της Οδηγίας 70/524/ΕΚ (23.11.1970):

Οδηγία 96/25/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.1996,
Κανονισμός της Επιτροπής 2316/98/ΕΚ της 26.10.1998,
Κανονισμός της Επιτροπής 1594/99/ΕΚ της 20.7.1999,
Κανονισμός της Επιτροπής 2419/99/ΕΚ της 17.11.1999,
Κανονισμός της Επιτροπής 2652/99/ΕΚ της 3.12.1999,
Κανονισμός της Επιτροπής 1353/00/ΕΚ της 26.6.2000,
Κανονισμός της Επιτροπής 2437/00/ΕΚ της 3.12.2000,
Κανονισμός της Επιτροπής 937/01/ΕΚ της 11.5.2001
Κανονισμός της Επιτροπής 418/01/ΕΚ της 1.3.2001,
Κανονισμός της Επιτροπής 937/01/ΕΚ της 11.5.2001,
Κανονισμός της Επιτροπής 1334/01/ΕΚ της 2.7.2001»,

Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ασκώντας τις
13(I) του 1993 εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 30, των περί Ζωοτροφών και Προσθετι-
34(I) του 2001 κών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) Νόμων
53(I) του 2002 του 1993 έως 2002 και ο Κανονισμός 39 των περί Ζωοτροφών και Προσθετι-
Επίσημη κών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) Κανο-
Εφημερίδα, νισμών του 2001, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα.
Παράρτημα
Τρίτο (I):
19.3.2001.

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Ζωοτροφών και Προσθε-
τικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) (Τρο-
ποποίηση Παραρτημάτων) Διάταγμα του 2002.

Εμπνεύει.

2. Στο παρόν Διάταγμα—

"Επιτροπή" σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
19.3.2001.

"Κανονισμοί" σημαίνει τους περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των
Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) Κανονισμούς
του 2001.

Τροποποίηση
του Μέρους Δ,
του Παραρτή-
ματος 4.

3. Οι παράγραφοι 2, 5 και 9 του Μέρους Δ, του Παραρτήματος 4, των
Κανονισμών, τροποποιούνται ως εξής:

(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου 2, από την ακόλουθη παρά-
γραφο:

"2. Δέρματα κατεργασμένα με δεψικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων
και των αποβλήτων τους"

- (β) Με την αντικατάσταση της παραγράφου 5, από την ακόλουθη παράγραφο:

"5. Όλα τα απόβλητα που λαμβάνονται από τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας επεξεργασίας αστικών, οικιακών και βιομηχανικών λυμάτων, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των εν λόγω αποβλήτων και ανεξάρτητα από την προέλευση των λυμάτων."

- (γ) Με την αντικατάσταση της παραγράφου 9, από την ακόλουθη παράγραφο:

"9. Οι μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες, (δηλαδή τα κρεατάλευρα, κρεατοστεάλευρα, οστεάλευρα, αποξηραμένο πλάσμα και λοιπά προϊόντα αίματος, προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών, άλευρα οπλών, άλευρα κεράτων, άλευρα και υποπροϊόντα πουλερικών, πτεράλευρα, υπολείμματα τήξης χοιρινού λίπους σε ξηρή κατάσταση, ιχθυάλευρα, φωσφορικό διασβέστιο, ζελατίνη και λοιπά παρόμοια προϊόντα περιλαμβανομένων των μιγμάτων, των ζωοτροφών, των προσθετικών ουσιών και των προμιγμάτων που περιέχουν αυτά τα προϊόντα), με εξαίρεση—

- (1) Των ιχθυάλευρων στη διατροφή ζώων άλλων από τα μηρυκαστικά, μόνο σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο περί της Χρησιμοποίησης Ιχθυάλευρων στη Διατροφή των Ζώων Διάταγμα του 2001,

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο(I):
5.10.2001.

- (2) της ζελατίνης μη μηρυκαστικών για την επικάλυψη των προσθετικών ουσιών που αναφέρονται στο Παράρτημα 15 των παρόντων Κανονισμών,

- (3) του φωσφορικού διασβεστίου στη διατροφή ζώων άλλων από τα μηρυκαστικά, μόνο σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο περί της Πρόληψης Εισόδου και Εξάπλωσης της Σπογγειόμορφης Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (BSE) Διάταγμα του 2001,

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο(I):
12.1.2001.

- (4) των προϊόντων υδρόλυσης (π.χ. αμινοξέων) από προβιές και δέρματα στη διατροφή ζώων άλλων από μηρυκαστικά, μόνο εφόσον—

(i) προέρχονται από προβιές και δέρματα που λαμβάνονται από ζώα που έχουν σφαγεί σε σφαγείο και τα σφάγια των κριθήκαν κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση ύστερα από έλεγχο και πριν και μετά τη σφαγή,

(ii) παράγονται με μέθοδο παραγωγής, η οποία περιλαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό στο ελάχιστο της μόλυνσης των προβιών και δερμάτων, προετοιμασία της πρώτης ύλης με εμβάπτιση σε άλμη, εμβάπτιση σε ασβέστη και εντατική πλύση, ακολουθούμενη από έκθεση του υλικού σε $pH > 11$ για περισσότερο από τρεις ώρες σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των $80^{\circ}C$ και ακο-

λουθούμενη από θερμική κατεργασία σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 140°C για 40 λεπτά σε πίεση μεγαλύτερη των 3,6 bar, ή με ισοδύναμη μέθοδο παραγωγής εγκεκριμένη από την Επιτροπή,

(iii) παράγονται σε μονάδα επεξεργασίας που παράγει μόνο προϊόντα υδρόλυσης, που είναι εγκεκριμένη για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Πρόληψης Μεταδοτικών Νόσων των Ζώων (Ρύθμιση Ζωικών Αποβλήτων και Ζωοτροφών Ζωικής Προέλευσης) Διάταγμα του 1998,

(iv) έχουν μοριακό βάρος μικρότερο των 10.000 Dal-tons, όπως διαπιστώνεται από τη δειγματοληψία μετά τη μεταποίηση,

(v) η εισαγωγή τους επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Πρόληψης Μεταδοτικών Νόσων των Ζώων (Ρύθμιση Ζωικών Αποβλήτων και Ζωοτροφών Ζωικής Προέλευσης) Διάταγμα του 1998,

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο(I):
27.2.1998.

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο(I):
27.2.1998.

(5) του γάλακτος και προϊόντων γάλακτος προοριζομένων για τη διατροφή ζώων για παραγωγή τροφίμων."

Τροποποίηση
του Μέρους Α,
του Παραρτή-
ματος 15.
Πίνακας Ι.

4. Το Μέρος Α, του Παραρτήματος 15, των Κανονισμών, τροποποιείται όπως καθορίζεται στην παρούσα παράγραφο και στον Πίνακα Ι, του παρόντος Διατάγματος, ο οποίος προσδιορίζει τις τροποποιήσεις στις πιο κάτω κατηγορίες προσθετικών ουσιών στο Μέρος Α, του Παραρτήματος 15, των Κανονισμών ως εξής:

Πίνακας Ι.

(α) Προσθήκη στην κατηγορία "Α. Αντιβιοτικά" στην κατάλληλη αριθμητική θέση του αντιβιοτικού "γλαβοφωσφολιπόλη" με αριθμό Ευρωπαϊκής Ένωσης E712 χωρίς υπεύθυνο κυκλοφορίας, για χρήση στις όρνιθες ωοτοκίας, γάλους, λοιπά πουλερικά εκτός χήνων, πάπιων και περιστεριών, χοιρίδια, χοίρους, ζώα γούνας εκτός κουνελιών, στα δαμάλια και στα παχυνόμενα βοοειδή, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται για τα ζώα αυτά στον Πίνακα Ι, ο οποίος προσδιορίζει τις τροποποιήσεις που επιφέρονται στο Μέρος Α, του Παραρτήματος 15, των Κανονισμών·

Πίνακας Ι.

(β) προσθήκη στην κατηγορία "Β. Αντιοξειδωτικά" των εξής αντιοξειδωτικών: E320 "βουτυλική υδροξυανισόλη", E321 "βουτυλικό υδροξυτολουόλιο" και η E324 "εθοξυκουνίνη", για χρήση στους σκύλους, με βάση τις λεπτομέρειες που καθορίζονται για τα αντιοξειδωτικά αυτά στον Πίνακα Ι, ο οποίος προσδιορίζει τις τροποποιήσεις που επιφέρονται στο Μέρος Α, του Παραρτήματος 15, των Κανονισμών·

(γ) τροποποίηση της κατηγορίας "Δ. Κοκκιδιοστατικά" ως ακολούθως:

(i) διαγραφή του διμετριδαζολίου E754·

Πίνακας Ι.

(ii) προσθήκη του κοκκιδιοστατικού E758 "ρομπενιδίνη" χωρίς υπεύθυνο κυκλοφορίας, για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα, γάλους και παχυνόμενα κουνέλια, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται για τα ζώα αυτά στον Πίνακα Ι, ο οποίος προσδιορίζει τις τροποποιήσεις που επιφέρονται στο Μέρος Α, του Παραρτήματος 15, των Κανονισμών·

- (iii) προσθήκη του κοκκιδιοστατικού E763 "λασαλοσινικό νάτριο" χωρίς υπεύθυνο κυκλοφορίας, για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα και κοτόπουλα για αυγοπαράγωγή, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται για τα ζώα αυτά στον Πίνακα I, ο οποίος προσδιορίζει τις τροποποιήσεις που επιφέρονται στο Μέρος Α, του Παραρτήματος 15, των Κανονισμών·
- (iv) προσθήκη του κοκκιδιοστατικού E764 "αλοφουτζινόνη" χωρίς υπεύθυνο κυκλοφορίας, για χρήση στα κοτόπουλα και γάλους, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται για τα ζώα αυτά στον Πίνακα I, ο οποίος προσδιορίζει τις τροποποιήσεις που επιφέρονται στο Μέρος Α, του Παραρτήματος 15, των Κανονισμών·
- (v) προσθήκη του κοκκιδιοστατικού E766 "σαλινομυκινικό νάτριο" με υπεύθυνο κυκλοφορίας την Intervet International B.V., για χρήση στα παχυνόμενα κουνέλια σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται για τα ζώα αυτά στον Πίνακα I, ο οποίος προσδιορίζει τις τροποποιήσεις που επιφέρονται στο Μέρος Α, του Παραρτήματος 15, των Κανονισμών·
- (vi) προσθήκη του κοκκιδιοστατικού E771 "δικλαζουρίλη" με υπεύθυνο κυκλοφορίας την Janssen Animal Health B.V. BA, για χρήση στους γάλους και κοτόπουλα παχυνόμενα σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται για τα ζώα αυτά στον Πίνακα I, ο οποίος προσδιορίζει τις τροποποιήσεις που επιφέρονται στο Μέρος Α, του Παραρτήματος 15, των Κανονισμών·
- (δ) τροποποίηση της κατηγορίας "Στ. Χρωστικές Ουσίες" ως ακολούθως:
 - (i) προσθήκη νέας στήλης με τίτλο "Διάρκεια έγκρισης"·
 - (ii) στη χρωστική ουσία με αριθμό E161B, στη στήλη "προσθετικό", προστίθενται οι λέξεις "ή ωχρίνη" μετά από το όνομα "λουτεΐνη"·
- (ε) τροποποίηση της κατηγορίας "Ζ. Συντηρητικά" ως ακολούθως:
 - (i) προσθήκη νέας στήλης με τον τίτλο "Διάρκεια έγκρισης"·
 - (ii) περιορισμός του τρόπου χρήσης του μυρμηγκικού οξέως (E236) με άλλα οξέα·
- (στ) προσθήκη στην κατηγορία "Θ. Ιχνοστοιχεία" των εξής:
 - (i) νέας στήλης με τον τίτλο "Διάρκεια έγκρισης",
 - (ii) του προσθετικού E4 "Χαλκική χηλική ένωση ενυδατωμένη", σαν μορφή χαλκού επιτρεπόμενη για χρήση στις ζωοτροφές για χοίρους παχυνόμενους, χοίρους αναπαραγωγής και άλλα είδη ή κατηγορίες ζώων, εκτός από τα δαμάλια προτού αρχίσουν να μηρυκάσουν και τα πρόβατα, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται για τα ζώα αυτά στον Πίνακα I, ο οποίος προσδιορίζει τις τροποποιήσεις που επιφέρονται στο Μέρος Α, του Παραρτήματος 15, των Κανονισμών·
 - (iii) του προσθετικού E5 "Μαγγανική χηλική ένωση αμινοξέων "ενυδατωμένη", σαν μορφή μαγγανίου επιτρεπόμενη για χρήση στις ζωοτροφές, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται για τη χρήση του στον Πίνακα I, ο οποίος προσδιορίζει τις τροποποιήσεις που επιφέρονται στο Μέρος Α, του Παραρτήματος 15, των Κανονισμών·

- Πίνακας I.
- (iv) του προσθετικού E6 "Χηλική ένωση αμινοξέων ψευδαργύρου ενυδατωμένη", σαν μορφή ψευδαργύρου επιτρεπόμενη για χρήση στις ζωοτροφές σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται για τη χρήση του στον Πίνακα I, ο οποίος προσδιορίζει τις τροποποιήσεις που επιφέρονται στο Μέρος Α, του Παραρτήματος 15, των Κανονισμών·
- (ζ) τροποποίηση της κατηγορίας "ΙΒ. Συνδεδειγμένες, αντισυσσωματικές και πτητικές ουσίες" ως εξής:
- (i) Προσθήκη νέας στήλης με τον τίτλο "Διάρκεια έγκρισης"·
- (ii) αντικατάσταση του αριθμού για τη συνδεδειγμένη ουσία E553 σεπιολίτης, με τον αριθμό E562·
- (iii) εισαγωγή για την κατηγορία αυτή, του όρου "μέγιστη συγκέντρωση διοξίνης" για τα προσθετικά με αριθμούς E516 έως E598·
- (iv) προσθήκη της συνδεδειγμένης ουσίας E566 "νατρολίτης φωνόλιθος" για χρήση σε όλες τις κατηγορίες ζώων σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται για τα ζώα αυτά στον Πίνακα I, ο οποίος προσδιορίζει τις τροποποιήσεις που επιφέρονται στο Μέρος Α, του Παραρτήματος 15, των Κανονισμών·
- Πίνακας I.
- (η) προσθήκη στην κατηγορία "ΙΔ. Ένζυμα" του ενζύμου E1600 "3. φυτάση EC 3.1.3.8", για χρήση στα χοιρίδια, στους παχυνόμενους χοίρους, χοιρομητέρες, παχυνόμενα κοτόπουλα και όρνιθες ωοτοκίας, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται για τα ζώα αυτά στον Πίνακα I, ο οποίος προσδιορίζει τις τροποποιήσεις που επιφέρονται στο Μέρος Α, του Παραρτήματος 15, των Κανονισμών·
- Πίνακας I.
- (θ) προσθήκη στην κατηγορία "ΙΕ. Μικροοργανισμοί" του μίγματος μικροοργανισμών E1700 αποτελούμενο από το "Bacillus licheniformis (DSM5749) και Bacillus subtilis (DSM5750) σε αναλογία 1/1" για χρήση στα χοιρίδια, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται για τα ζώα αυτά στον Πίνακα I, ο οποίος προσδιορίζει τις τροποποιήσεις που επιφέρονται στο Μέρος Α, του Παραρτήματος 15, των Κανονισμών·
- Πίνακας I.
5. Το Μέρος Β, του Παραρτήματος 15, των Κανονισμών τροποποιείται όπως καθορίζεται στην παρούσα παράγραφο και στον Πίνακα II, του παρόντος Διατάγματος, ο οποίος προσδιορίζει τις τροποποιήσεις στις πιο κάτω κατηγορίες προσθετικών ουσιών του Μέρους Β, του Παραρτήματος 15, των Κανονισμών, ως εξής:
- (α) Τροποποίηση της κατηγορίας "Δ. Ουσίες προαγούσες την ανάπτυξη" με την παραχώρηση προσωρινής άδειας χρήσης για το "διμυρμηγικό Κάλιο" με αριθμό Ευρωπαϊκή Ένωσης 1, για χρήση στα χοιρίδια και παχυνόμενους χοίρους, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται για τα ζώα αυτά στον Πίνακα II, ο οποίος προσδιορίζει τις τροποποιήσεις που επιφέρονται στο Μέρος Β, του Παραρτήματος 15, των Κανονισμών·
- Πίνακας II.
- (β) τροποποίηση της κατηγορίας "Ε. Ένζυμα" με την παραχώρηση προσωρινής άδειας χρήσης των πιο κάτω ενζύμων, σύμφωνα με όλες τις αντίστοιχες πρόνοιες που καθορίζονται στον Πίνακα II, ο οποίος προσδιορίζει τις τροποποιήσεις που επιφέρονται στο Μέρος Β, του Παραρτήματος 15, των Κανονισμών:
- Πίνακας II.

- (i) του παρασκευάσματος ενζύμων με αριθμό 11 αποτελούμενο από—
 - "Ενδο-1,4-β-γλυκανάση EC3.2.1.4,
 - Ενδο-1,4(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.6 και
 - Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC3.2.1.8",για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα και παχυνόμενους γάλους,
- (ii) του ένζυμου "ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC3.2.1.8" με αριθμό 23, για χρήση στους παχυνόμενους γάλους και όρνιθες ωτοκίας,
- (iii) του παρασκευάσματος ενζύμων με αριθμό 27 αποτελούμενο από—
 - "Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC3.2.1.8 και
 - Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.6"για χρήση στα χοιρίδια,
- (iv) του ένζυμου "3 - φυτάση EC3.1.3.8" με αριθμό 28, για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα,
- (v) του παρασκευάσματος ενζύμων με αριθμό 30 αποτελούμενο από—
 - "Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.6 και
 - Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC3.2.1.8"για χρήση στους παχυνόμενους γάλους, όρνιθες ωτοκίας και παχυνόμενους χοίρους,
- (vi) του ένζυμου "ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC3.2.1.8" με αριθμό 51 για χρήση στα χοιρίδια,
- (vii) του παρασκευάσματος ενζύμων με αριθμό 59 αποτελούμενο από—
 - "Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC3.2.1.8,
 - Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.6,
 - σουμπτιλίσίνη EC3.4.21.62,
 - α-αμυλάση EC3.2.1.1 και
 - πολυγαλακτουρονάση EC3.2.1.15"για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα,
- (viii) του παρασκευάσματος ενζύμων με αριθμό 60 αποτελούμενο από—
 - "Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC3.2.1.8 και
 - Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.6"για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα·
- (ix) του παρασκευάσματος ενζύμων με αριθμό 61 αποτελούμενο από—
 - "Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC3.2.1.8 και
 - Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC3.2.1.6"για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα·
- (γ) τροποποίηση της κατηγορίας "Στ. Μικροοργανισμοί", με την παραχώρηση προσωρινής άδειας χρήσης των μικροοργανισμών, σύμφωνα με όλες τις αντίστοιχες προνοιες που καθορίζονται στον Πίνακα II, Πίνακας II. ο οποίος προσδιορίζει τις τροποποιήσεις που επιφέρονται στο Μέρος Β, του Παραρτήματος 15, των Κανονισμών—
 - (i) του "Saccharomyces cerevisiae CBS 493.24" με αριθμό 5, για

Κ.Α.Π. 246/2002

2200

χρήση στις αρμεγόμενες αγελάδες·

- (ii) του παρασκευάσματος των "Bacillus licheniformis" (DSM 5749) και Bacillus subtilis (DSM 5750) σε αναλογία 1/1", με αριθμό 20, για χρήση στα δαμάλια,
- (iii) του "Enterococcus faecium DSM 3530" με αριθμό 21, για χρήση στα δαμάλια.

Εγκρίθηκε στις 30 Απριλίου 2002.

ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ,
Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων
και Περιβάλλοντος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
(Παράγραφος 4)

ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Α, ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 15, ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Πρώτη Τροποποίηση που αφορά τις πιο κάτω κατηγορίες προσθετικών: Α. Αντιβιοτικά, Β. Αντιοξειδωτικά, Δ. Κοκκιδιοστατικά, ΣΤ. Χρωστικές ουσίες, Ζ. Συντηρητικά, Θ. Ιχνοστοιχεία, ΙΒ. Συνδετικές, Αντισυσωματικές και Πηκτικές ουσίες, ΙΔ. Ένζυμα, ΙΕ. Μικροοργανισμούς, ως έχουν διαμορφωθεί μετά την τροποποίηση¹.

Αριθμός Ε.Ε.	Επωνυμία και αριθμός καταχώρη- σης του υπεύθυνου κυκλοφορίας	Προσθετικό (εμπορική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες πρόνοιες	Διάρκεια έγκρισης
						της δραστικής ουσίας/ kg πλήρους ζωοτροφής			
Ε 712		Α. Αντιβιοτικά Φλαβοφωσφολιπόλη (Flavophosphorholipol)	C ₇₀ H ₁₂₄ O ₁₀ N ₆ P	Όρνιθες ωστοκίας Γάλοι Λοιπά πουλερικά εκτός χήνων, πάπιων και περιστεριών Χοιρίδια Χοίροι	-	2	5	-	
					26 βδομ.	1	20	-	
					16 βδομ.	1	20	-	
					3 μήνες	10	25	-	
					6 μήνες	1	20	-	

¹ Οι λοιπές κατηγορίες παραμένουν ως έχουν στην Κ.Δ.Π. 131/2001

Αριθμός Ε.Ε.	Επωνυμία και αριθμός καταχώρη- σης του υπεύθυνου κυκλοφορίας	Προσθετικό (εμπορική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες προνοιές	Διάρκεια έγκρισης
						mg δραστικής ουσίας/ kg πλήρους ζωοτροφής	ντρωση		
E 712	Hoechst Roussel Vet GmbH	Φλαβοφωσφολιπόλη 80 g/kg (Flavomycin 80)	Σύνθεση προσθετικού: Φλαβοφωσφολιπόλη: ≥80 g δραστικότητα/kg Διοξείδιο του πυριτίου: 50-150 g/kg Ανθρακικό ασβέστιο: 0-400 g/kg Φλαβοφωσφολιπόλη: ≥40 g δραστικότητα/kg	Ζώα για γούν- να εκτός των κουνελιών	-	2	4	-	30.9.2009
				Δαμάκια	6 μήνες 6 μήνες	6 8	16 16	Υποκατάστατα γάλακτος μόνο	
				Βοειδή παχυνόμενα	-	2	10	Να αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης: "-Για συμπλη- ρωματικές ζωοτροφές η μέγιστη δόση στο σιτηρέσιο δεν πρέπει να υπερβαίνει: - Για 100 kg σωματικό βάρος: 40mg. - Άνω των 100kg: πρόσθεσε 1.5mg για κάθε πρόσθετα 10kg σωματικού βάρους".	
				Κουνέλια	-	2	4	-	

Αριθμός Ε.Ε.	Επωνυμία και αριθμός καταχώρη- σης του υπεύθυνου κυκλοφορίας	Προσθετικό (εμπορική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση της δραστικής ουσίας/ kg πλήρους ζωοτροφής	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες προνοίες	Διάρκεια έγκρισης
E 714		Μονενσινικό νάτριο (Monensin sodium)	Διοξειδίο του πυριτίου: 20-120 g/kg Ανθρακικό ασβέστιο: 200-750 g/kg Δραστική ουσία: Φλοβαφωφολιπόλη, Αριθ. CAS:11015-37-5, (μονομυκίνη Α: $C_{36}H_{104}N_5O_{34}P$), φωσφογλυκολιπίδιο παράγόμενο με ζύμωση του <i>Streptomyces ghanaensis</i> (DSM 12218), αναλογία αντιβιοτικών παραγόντων: μοενομυκίνη Α: 40-80% μοενομυκίνη Α _{1/2} : 0-20% μοενομυκίνη C ₁ : 0-20% μοενομυκίνη C ₃ : 5-25% μοενομυκίνη C ₄ : 0-15% $C_{36}H_{61}O_{11}Na$ (άλας νατρίου του πολυαιθερικού μονοκαρβοξυ- λικού οξέος παραγόμενου από τον <i>Streptomyces</i> <i>cinnamomensis</i>)	Βοειδή παχυνόμενα	-	10	40	Να αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης: - Για συμπλη- ρωματικές ζωοτροφές η μέγιστη δόση στο σιτηρέσιο δεν πρέπει να υπερβάλει: - Για 100Kg σωματικό βάρος: 140mg - Άνω των 100Kg σωματικού	

Αριθμός Ε.Ε.	Επωνυμία και αριθμός καταχώρη- σης του υπεύθυνου κυκλοφορίας	Προσθετικό (εμπορική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συνέ- νωση		Μέγιστη συνέ- νωση	Άλλες προνοιες	Διάρκεια έγκρισης
						της δραστηκής ουσίας/ kg πλήρους ζωοτροφής				
									βάρους: πρόσθεσε 6mg για κάθε πρόσθετα 10kg συνολικού βάρους".	

Αριθμός Ε.Ε.	Επωνυμία και αριθμός καταχώρη- σης του υπεύθυνου κυκλοφορίας	Προσθετικό (εμπορική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση της δραστικής ουσίας/ kg πλήρους ζωοτροφής	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες πράξεις	Διάρκεια έγκρισης
E 716	Hoechst Roussel Vet GmbH	Σαλινομυκινικό νάτριο 120 g/kg (Salacin 120 micro Granulate)	Σύνθεση προσθετικού: Σαλινομυκινικό νάτριο: ≥120 g/kg Διοξείδιο του πυριτίου: 10-100 g/kg Ανθρακικό ασβέστιο: 350-700 g/kg Δραστική ουσία: Σαλινομυκινικό νάτριο, $C_{42}H_{69}O_{11}Na$, Αριθ. CAS: 53003-10-4, Άλας με νάτριο πολυσαθέρα μονοκαρβονικού οξέος, παραγόμενου με ζύμωση από τον <i>Sitreptomycetes albus</i> (DSM 12217) Συγγενείς προσαμίξεις: < 42 mg ελασιφυλίνης/kg σαλινομυκινικού νατρίου, < 40 g 17-επι-20-δεοξυσαλινο- μυκίνης/kg σαλινομυκινικού νατρίου	Χοιρidia	4 μήνες	30	60	Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να αναφέρουν: "Επικινδύνo για τα ιπποειδή". "Η τροφή αυτή περιέχει προσθε- τικό της ομάδας των ιονοφόρων" η ταυτόχρονη χορήγηση της με ορισμένα φάρμακα (την τιαμουλίνη, για παράδειγμα) μπορεί να αντενδείκνυται".	30.9.2009
				Χοίροι παχυνόμενοι	6 μήνες	15	30	Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να αναφέρουν: "Επικινδύνo για τα ιπποειδή". "Η τροφή αυτή περιέχει προσθε- τικό της ομάδας των ιονοφόρων" η ταυτόχρονη χορήγηση της με ορισμένα φάρμακα (την τιαμουλίνη, για παράδειγμα) μπορεί να αντενδείκνυται".	30.9.2009

Αριθμός Ε.Ε.	Επωνυμία και αριθμός καταχώρι- σης του υπεύθυνου κυκλοφορίας	Προσθετικό (εμπορική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση mg δραστικής ουσίας/ kg πλήρους ζωοτροφής		Μέγιστη συγκέ- ντρωση mg δραστικής ουσίας/ kg πλήρους ζωοτροφής	Άλλες προνοιες	Διάρκεια έγκρισης
E 717	Eli Lilly and Company Ltd.	Αβιλαμικίνη 200 g/kg (Maxus G200, Maxus 200)	Σύνθεση προσθετικών: Αβιλαμικίνη: δραστηκότητα 200 g/kg Έλαιο σόγιας ή ορυκτό λάδι: 5-30 g/kg Προϊόντα ελαιοργείων σόγιας qs 1 kg	Χοιρίδια	4 μήνες	20	40	--	30.9.2009	30.9.2009
		Αβιλαμικίνη 100 g/kg (Maxus G100, Maxus 100)	Αβιλαμικίνη: δραστηκότητα 100 g/kg Έλαιο σόγιας ή ορυκτό λάδι: 5-30 g/kg Προϊόντα ελαιοργείων σόγιας qs 1 kg	Χοιρίδια παχυνόμενα	6 μήνες	10	20	--		
			Δραστική ουσία: Αβιλαμικίνη, $C_{57}H_{62}O_{11}Cl_{12}O_{31-32}$, Αριθ. CAS αβιλαμικίνης Α: 69787-79-7, Αριθ. CAS αβιλαμικίνης Β: 73240-30-9, Μείγμα ολιγοσακχαριτών της ομάδας της ορθοοσμικίνης παραγόμενο από Streptomyces viridochromogenes (NRRL 2860), σε κοκκώδη μορφή Αναλογία παραγόντων: Αβιλαμικίνη Α: $\geq 60\%$ Αβιλαμικίνη Β: $\leq 18\%$ Αβιλαμικίνης Α+Β: $\geq 70\%$ Λοιπές αβιλαμικίνες, μόνες: $\leq 6\%$	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	2,5	10	--		

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέντρωση mg/Kg	Μέγιστη συγκέντρωση	Άλλες προνοιες
					πλήρους ζωτροφής	ζωτροφής	
	Β. Αντιοξειδωτικά		όλα τα είδη ή κατηγορίες ζώων	-	-	-	Όλες οι ζωτροφές
E 300	L. Ασκορβικό οξύ	C ₆ H ₈ O ₆		-	-	-	
E 301	L. Ασκορβικό νάτριο	C ₆ H ₇ O ₆ Na		-	-	-	
E 302	L. Ασκορβικό ασβέστιο	C ₁₂ H ₁₄ O ₁₂ Ca.2H ₂ O		-	-	-	
E 303	5,6-Διακετυλ-L- ασκορβικό οξύ	C ₁₆ H ₁₂ O ₈		-	-	-	
E 304	6-Παλμιτοϋλ-L- ασκορβικό οξύ	C ₂₂ H ₃₈ O ₇		-	-	-	
E 306	φυσικής προέλευσης εγχυλιμαστά πλούσια σε τοκοφερόλη	-		-	-	-	
E 307	Συνθετική α-τοκοφερόλη	C ₂₉ H ₅₀ O ₂		-	-	-	
E 308	Συνθετική γ-τοκοφερόλη	C ₂₉ H ₄₆ O ₂		-	-	-	
E 309	Συνθετική δ-τοκοφερόλη	C ₂₇ H ₄₆ O ₂		-	-	-	
E 310	Γαλλικός προπιλεστήρ	C ₁₀ H ₁₂ O ₅	Όλα τα είδη ή κατηγορίες ζώων εκτός από σκύλους	-	-	100: χωριστά η κάθε ουσία ή μαζί	
E 311	Γαλλικός οκτυλεστήρ	C ₁₅ H ₂₂ O ₅		-	-	-	
E 312	Γαλλικός δωδεκυλεστήρ	C ₁₉ H ₃₀ O ₅		-	-	-	
E 320	Βουτυλική υδροξυανισόλη (BHA)	C ₁₁ H ₁₆ O ₂		-	-	150: χωριστά η κάθε ουσία ή μαζί	
E 321	Βουτυλικό υδροξυτολουόλιο (BHT)	C ₁₅ H ₂₄ O	-	-	-	-	
E 324	Εθοξυκουλίνη (Ethoxyquin)	C ₁₄ H ₁₉ ON	-	-	-	-	

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέντρωση mg/kg	Μέγιστη συγκέντρωση ζωτροφής	Άλλες προνοιες
					πλήρους	ζωτροφής	
Ε 320	Βουτυλική υδροξυανισόλη (BHA)	$C_{11}H_{16}O_2$	Σκύλοι	-	-	150: χωριστά η κάθε ουσία ή μαζί	Το μίγμα της Εθοξυκουίνης με ΒΗΑ ή και ΒΗΤ επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική ποσότητα του μίγματος δεν υπερβαίνει τα 150 mg/kg πλήρους ζωτροφής
Ε 321	Βουτυλικό υδροξυτολουόλιο (BHT)	$C_{15}H_{24}O$		-	-		
Ε 324	Εθοξυκουίνη (Ethoxyquin)	$C_{14}H_{18}ON$	Σκύλοι	-	-	100	

Αριθμός Ε.Ε.	Επιπαιγμία και αριθμός καταχύρη- σης του υπεύθυνου κυκλοφορίας	Προσθετικό (εμπορική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες προνοιές	Διάρκεια έγκρισης
						mg δραστικής ουσίας/ kg πλήρους ζωοτροφής			
E 750		Δ. Κοκκιδιοσταθικά και λοιπές φαρμακευτικές ουσίες Αμπρόλιουμ (Amprolium)	Υδροχλωρικό 1-[(4-αμινο- -2 προπυλοπυριμιδινό-5- -υλ)μεθυλο]-2-μεθυλο- πυριμιδινό χλωριούχο	Πουλερικά	-	62.5	125	Απαγορεύεται η χρήση από της έναρξης της ωστικής και τουλάχιστο 3 μέρες πριν τη σφαγή, αντίστοιχα	
E 751		Αμπρόλιουμ/ εθοπάμπειτ (Μείγμα: 25 μέρη του α) αμπρόλιουμ και 1,6 μέρη του β) εθομάμπειτ (Amprolium/ ethopabate)	α) Υδροχλωρικό 1-[(4-αμινο- -2-προπυλοπυριμιδινό -5-υλ-) μεθυλο] -2- μεθυλοπυριμιδινό χλωριούχο. β) Αιθυλεστίη του μεθυλο- 4-ακεταμίδιο 2- βενζοϊκού οξέος	) Κοτόπουλα,) γάλοι) και) φραγκό-) κοτες) (guinea) (fowl))	-	66.5	133	Απαγορεύεται η χρήση από της ηλικίας ωστικής και τουλάχιστο 3 μέρες πριν τη σφαγή, αντίστοιχα	
E 755		Μετκλοριπιντόλη (Meclorepintol)	3,5-δihχλωρο-2,6 διμεθυλο πυριμιδινό -4-όλη	Κοτόπουλα παχυνόμενα, φραγκόκοτες (guinea fowl)	-	125	125	Απαγορεύεται η χρήση από της ηλικίας ωστικής και τουλάχιστο 5 μέρες πριν τη σφαγή, αντίστοιχα	
				Κουνέλια	-	125	200	Απαγορεύεται η χρήση τουλάχιστο 5 μέρες πριν τη σφαγή	

Αριθμός Ε.Ε.	Επωνυμία και αριθμός καταχώρι- σης του υπεύθυνου κυκλοφορίας	Προσθετικό (εμπορική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση mg kg φρέσκιας συνολικής ζωομάζας	Μέγιστη συγκέ- ντρωση mg	Άλλες προνοιες	Διάρκεια έγκρισης
E 756		Ντεκοκινένιτ (Decoquinale)	3-εθοξυκαρβονυλ-4-υδροξυ-6- δεκυλοξυ-7-εθοξυκινολίνη	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	20	40	Απαγορεύεται η χρήση τουλάχιστο 3 μέρες πριν τη σφαγή	
E 757		Μονενσινικό νάτριο (Monensin sodium)	$C_{38}H_{61}O_{11}Na$ (άλας νατρίου του πολυαιθερικού μονοκαρβο- ξυλικού οξέος παραγόμενου από τον <i>Streptomyces</i> <i>cinnamomensis</i>)	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	100	125	Απαγορεύεται η χρήση τουλάχιστο 3 μέρες πριν τη σφαγή.	
				Κοτόπουλα εκτρεφόμενα για αυγο- παραγωγή Γάλα	16 βδομ.	100	120		
					16 βδομ.	90	100	Απαγορεύεται η χρήση τουλάχιστο 3 μέρες πριν τη σφαγή. Να αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης για όλα τα ζώα: "- Επικίνδυνο για ιπποειδή. - Η τροφή αυτή περιέχει προσθετικό της ομάδας των ιονοφόρων" ή ταυτόχρονη χορήγηση της με ορισμένα φάρμακα (την παμουλίνη, για παράδειγμα) μπορεί να αντενδείκνυται".	

Αριθμός Ε.Ε.	Επωνυμία και αριθμός καταχώρι- σης του υπεύθυνου κυκλοφορίας	Προσθετικό (εμπορική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση		Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες πρόνοιες	Διάρκεια έγκρισης
						mg δραστηκής ουσίας/ kg πλήρους ζωοτροφής				
E 758		Ρομπενιδίνη (Robenidine)	1,3-δις[4 χλώρο βενζ(μιδένιο)-αμινο] υδροχλωρική γουανιδίνη	κοτόπουλα παχυνόμενα, γάλοι	-	30		36	Απαγορεύεται η χρήση τουλάχιστο 5 μέρες πριν από τη σφαγή	30.9.2009
				κουνέλια παχυνόμενα	-	50		66	Απαγορεύεται η χρήση τουλάχιστο 5 μέρες πριν από τη σφαγή	
E 758	Roche Vitamins Europe Ltd.	Υδροχλωρική ρομπενιδίνη 66 g/kg (Cycostat 66 G)	Σύνθεση προσθετικού: Υδροχλωρική ρομπενιδίνη: 66 g/kg Λιγνοσουλφονική ένωση: 40 g/kg Διένυδρο θειικό ασβέστιο: 894 g/kg Δραστηκή ουσία: Υδροχλωρική ρομπενιδίνη, C ₁₅ H ₁₃ Cl ₂ N ₆ ·HCl, υδροχλωρική 1,3-δις[(π-χλωρο- βενζ(μυλιδέν) αμινο] γουανιδίνη), αριθ. CAS: 25875-50-7 Συγγενείς προσμίξεις: N,N': N''-τρις [(π-Cl-βενζ(μυλιδέν) αμινο]γουανιδίνη: ≤ 1% Δις-[4-Cl-βενζ(μυλιδέν)]υδραζίνη: ≤ 1%	Κουνέλια για ανα- παραγωγή	-	50		66	Απαγορεύεται η χορήγηση τουλάχιστο πέντε ημέρες πριν από τη σφαγή	

Αριθμός Ε.Ε.	Επωνυμία και αριθμός καταχώρη- σης του υπεύθυνου κυκλοφορίας	Προσθετικό (εμπορική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη	Μέγιστη	Άλλες πρόνοιες	Διάρκεια έγκρισης
						συγκέ- ντρωση	συγκέ- ντρωση		
E 761		Μετικλορινπινόλη/ μεθυλοβενζοκάτη (Μίγμα από 100 μέρη της: α) μετικλορινπινόλης και 8,35 μέρη της β) μεθυλοβενζο- κάτης)	α) 3,5-δichλωρο-2,6-διμεθυλο- -πυριμιδινό-4-όλη β) 7-βενζυλοξυ-6-βουτυλο-3- μεθοξυκαρβονυλο-κινολόνη	)Κοτόπουλα)παχυνόμενα))Κοτόπουλα)εκτρεφόμενα)για αυγο-)παραγωγή)Γάλοι	- 16 βδομ. 12 βδομ.	110	110	Απαγορεύεται η χρήση τουλάχιστο 5 μέρες πριν τη σφαγή	30.9.2009
						110	110	-	
						110	110	Απαγορεύεται η χρήση τουλάχιστο 5 μέρες πριν τη σφαγή	
E 763	Produits Roche SA	Λασαλοσινικό νάτριο (Lasalocid sodium)	C ₃₄ H ₄₈ O ₈ Na (άλας νατρίου του πολυαιθερικού μονοκαρβοξυλι- κού οξέος παραγόμενου από τον Streptomyces lasaliensis	Κοτόπουλα παχυνόμενα Κοτόπουλα εκτρεφόμενα για αυγο- παραγωγή	- 16 βδομ.	75	125	Απαγορεύεται η χρήση τουλάχιστο 5 μέρες πριν τη σφαγή	
						75	125	-	
E 763		Λασαλοσινικό νάτριο Lasalocid A sodium 15 g/100 kg (Avatec 15% cc)	Σύνθεση προσθετικού: Lasalocid A sodium: 15 g/100 g, Άλευρο από σπώδικα αραβο- σίτου: 80,95 g/100 g, Λεβήθνη: 2 g/100 g, Σογιέλαιο: 2 g/100 g, Οξείδιο του τρισθενούς σιδήρου: 0,05 g/100 g Δραστική ουσία: Lasalocid A sodium,	Γαλοπούλες	12 βδομ.	90	125	Απαγορεύεται η χορήγηση τουλάχισ- το 5 ημέρες πριν από τη σφαγή. Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να αναφέρονται: "Η τροφή αυτή περιέχει προσθετικό της ομάδας των ιονοφόρων"	

Αριθμός Ε.Ε.	Επωνυμία και αριθμός καταχώρη- σης του υπεύθυνου κυκλοφορίας	Προσθετικό (εμπορική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέν- τρωση		Μέγιστη συγκέν- τρωση	Άλλες προνοίες	Διάρκεια έγκρισης
						mg δραστικής ουσίας/ kg πλήρους ζωοτροφής				
E 764		Αλοφουζινόνη (Halofuginone)	$C_{34}H_{53}O_6Na$, Αριθ. CAS: 26999-20-6, άλας με νάτριο του 6-[(3R, 4S, 5S, 7R)-7- [2S, 3S, 5S)-5-αιθυλ-5-[(2R, 5R, 6S)-5-αιθυλ-5υδροξυ-6- μεθυλοτετραυδρο-2H- πυραν-2-υλ]-τετραυδρο-3- μεθυλο-2-φουρυλ]-4- υδροξυ- 3, 5-διμεθυλ-6- οξενενύλ]-2,3- οξυτολουυλικού οξέος παραγόμενου από <i>Streptomyces lasaliensis</i> subsp. <i>lasaliensis</i> (ATCC 31180) Συγγενείς προσιμείξεις: <i>Lasalocid sodium</i> B-E: ≤ 10% dl-τρανς-7-βρωμιο-6-χλωρο -3-[-(3-υδροξυ-2-πιπερι- δυλ)ακεταμιδα] κινναζολι- νο-4-(3H)ένα υδροβρώμιο	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	2	3	Απαγορεύεται η χρήση τουλάχιστο 5 μέρες πριν τη σφαγή.	η ταυτόχρονη χορήγησή της με ορισμένα φάρμακα μπορεί να αντενδείκνυται".	30.9.2009
				Γάλοι	12 βδομ.	2	3	Απαγορεύεται η χρήση τουλάχιστο 5 μέρες πριν τη σφαγή.		
				E 764	Hoechst Roussel Vel GmbH	Αλοφουζινόνη Halofuginone hydro- bromide 6 g/kg (Stenoral)	Σύνθεση προσθετικού: Υδροβρωμική αλοφουζινόνη: 6 g/kg, Ζελατίνη: 13,2 g/kg,	Κοτόπουλα εκτρεφόμενα για σαυγο- παραγωγή		

η ταυτόχρονη
χορήγηση της με
ορισμένα φάρμακα
μπορεί να
αντενδείκνυται".

Αριθμός Ε.Ε.	Επωνυμία και αριθμός καταχώρι- σης του υπεύθυνου κυκλοφορίας	Προσθετικό (εμπορική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση		Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες προνοιες	Διάκριση έγκρισης
						mg δραστικής ουσίας/ kg πλήρους ζωοτροφής				
Ε 765		Ναραζίνη (Narasin)	Άμυλο: 19,2 g/kg, Γλυκόζη: 21,6 g/kg, Ανθρακικό ασβέστιο: 940 g/kg Δραστική ουσία: Υδροβρωμική αλοφουζινόνη, C ₁₆ H ₁₇ BrClN ₃ O ₃ · HBr, Υδροβρωμική Di-trans-7- βρωμο-6-χλωρο-3-(3- (3-υδροξυ-2-πιπεριδυλ) ακετονυλ)κινναζολιν-4(3H)-όνη Αριθ. CAS: 64924-67-0 Συγγενείς προσιμείξεις: cis-ισομερές της αλοφουζι- νόνης: < 1,5% C ₄₃ H ₇₂ O ₁₁ (Πολυαιθέρας μονοκαρβοξυλικού οξέος παραγόμενος από τον Streptomyces aureofaciens)	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	60	70	Απαγορεύεται η χρήση τουλάχιστο 5 μέρες πριν τη σφαγή. Να αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης: *-Επικίνδυνο για ιπποειδή. - Η τροφή αυτή περιέχει προσθετικό της ομάδας των ιονοφόρων η ταυτόχρονη χορήγηση της με ορισμένα		

Αριθμός Ε.Ε.	Επωνυμία και αριθμός καταχώρι- σης του υπεύθυνου κυκλοφορίας	Προσθετικό (εμπορική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση mg kg πλήρους ζωοτροφής	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες προνοιες	Διάρκεια έγκρισης
E 766	Intervet International BV	Σαλινομυκινικό νάτριο (Salinomycine sodium) 120 g/kg (Sarco 120)	Σύνθεση Προσθετικού: Σαλινομυκινικό νάτριο: ≥120 g/kg, Διοξείδιο του πυριτίου: 10-100 g/kg, Ανθρακικό ασβέστιο: 350-700 g/kg Δραστηκή ουσία: Σαλινομυκινικό νάτριο $C_{42}H_{88}O_{11}Na$, αριθ. CAS: 53003-10-4 (άλας νατρίου του πολυαθρετικού μονοκαρβο- ξυλικού οξέος παραγόμενου από τον Streptomyces albus) (DSM 12217) Συγγενείς προσιμίες: ≤42 mg ελαιοφυλίνης/kg σαλινομυκινικού νατρίου ≤40g 17-επι-20-δεοξυ- σαλινομυκίνης/kg σαλινο- μυκινικού νατρίου	Κουνέλια παχυνόμενα	-	20	25	Απαγορεύεται η χρήση τουλάχιστο 5 μέρες πριν από τη σφαγή. Να αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης: - "Επικίνδυνο για τα ιπποειδή". - Η τροφή αυτή περιέχει προσθε- τικό της ομάδας των ιονοφόρων η ταυτόχρονη χορήγηση της με ορισμένα φάρμακα (την παμουλίνη, για παράδειγμα) μπορεί να αντενδύνεται".	31.5.2011
						100	125		
E 768		Νικαρπαζίνη (Nicarbazin)	Ισοβιορικό σύμπλοκο της 1,3-δισ(4-νιτροφαινυλο) ουρίας και της 4,6-διμεθυλοπυριμιδιν-2-όλης	Κοτόπουλα παχυνόμενα	4 βδομ.	100	125	Απαγορεύεται η χρήση τουλάχιστο 9 μέρες πριν από τη σφαγή.	

Αριθμός Ε.Ε.	Επωνυμία και αριθμός καταχώρι- σης του υπεύθυνου κυκλοφορίας	Προσθετικό (εμπορική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Μέγιστη συγκέ- ντρωση		Άλλες προναιες	Διάρκεια έγκρισης
						Ελάχιστη συγκέ- ντρωση	Μέγιστη συγκέ- ντρωση/ kg πλήρους ζωοτροφής		
E 769	Solvay Pharma- ceuticals BV	Νιφουρσάλη Nifursol 50g/100kg (Salturide 50DF)	Σύνθεση προσθετικού: Νιφουρσάλη: 50 g/100 g Σαγιέλιο: 34 g/100 g Άμυλο αραβοσίτου qs 100 g Δραστική ουσία: Νιφουρσάλη, $C_{12}H_{11}N_5O_8$, υδράζιδιο του 3,5-δινιτρο-N-(5- νιτροφουρουριλιδενο) σαλικυλικού οξέος, Αριθ. CAS: 16915-70-1 Καθαρότητα: $\geq 98,5\%$ σε άνυδρη μορφή Συγγενείς προσμιξεις: υδράζιδιο του 3,5-δινιτροσαλι- κυλικού οξέος: $\leq 0,5\%$ 5-νιτρο-2-φουρουραλαζίνη: $\leq 0,5\%$	Γάλοι	-	50	75	Απαγορεύεται η χορήγηση τουλάχισ- τον 5 ημέρες πριν από τη σφαγή Μέγιστη ποσότητα κονιορτού, εκλυό- μενη κατά τους χειρισμούς, όπως προσδιορίζεται με τη μέθοδο Stauber- Heubach ⁽¹⁾ : 0,1 µg νιφουρσάλης	30.9.2009
E 770	Roche Vitamins Europe Ltd.	Μαντουραμικινικό αμιώνιο άλας: 1 g/100 g (Cypro 1%)	Σύνθεση προσθετικού: Μαντουραμικινικό αμιώνιο άλας: 1g/100 g, Βενζυλική αλκοόλη: 5 g/100 g, Χοηδρατεσμένοι στάρκες αράβιδιου qs 100 g	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	5	5	Απαγορεύεται η χορήγηση τουλάχισ- τον 5 ημέρες πριν από τη σφαγή.	30.9.2009

Αριθμός Ε.Ε.	Επωνυμία και αριθμός καταχώρησής του υπεύθυνου κυκλοφορίας	Προσθετικό (εμπωρίκη ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέντρωση νιτρικής	Μέγιστη συγκέντρωση νιτρικής	Άλλες προνοίες	Διάρκεια έγκρισης
			Δραστική ουσία: Μαντουραμικινικό αμιμώνιο όλα: $C_{47}H_{103}O_{17}N$ Αριθ. CAS: 84878-61-5, αμιμωνικό άλας πολυαιθέρα μονοκαρβονικού οξέος, παραγόμενο από <i>Acetivomadura</i> <i>gymnaensis</i> (ATCC 31585) (NRRL 12515) Συνγενείς προσμείξεις: β-μαντουραμικινικό αμιμώνιο : <10%					Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να αναφέρονται "Επικίνδυνο για τα ιπποειδή". "Η τροφή αυτή περιέχει προσθετικό της ομάδας των ιονοφόρων η ταυτόχρονη χορήγηση της με ορισμένα φάρμακα (την τιμουλίνη, για παράδειγμα) μπορεί να αντενδείκνυται".	30.9.2009
E 771	Janssen Animal Health B.V.B.A.	Δικλαζουρίλη 0,5 g/100 kg (Clinacox 0,5% Premix)	Σύνθεση προσθετικού: Δικλαζουρίλη: 0,5 g/100 g Σογνάλευρο: 99,25 g/100 g Πολυβιδόνη K 30: 0,2 g/100 g Υδροξείδιο του νατρίου: 0,0538 g/100 g	)(Κοτόπουλα)Παχυνόμενα))))	-	1	1	Απαγορεύεται η χορήγηση τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από τη σφαγή.	30.9.2009
		Δικλαζουρίλη 0,2 g/100 kg (Clinacox 0,2% Pre-mix)	Δικλαζουρίλη: 0,2 g/100 g Σογνάλευρο: 39,7 g/100 g Πολυβιδόνη K 30: 0,08 g/100 g Υδροξείδιο του νατρίου: 0,0215 g/100 g Πιπράλευρο σίτου: 60 g/100 g	) Γάλοι)))))	12 βδομάδες	1	1	Απαγορεύεται η χορήγηση τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από τη σφαγή.	28.2.2011

Αριθμός Ε.Ε.	Επωνυμία και αριθμός καταχώρη- σης του υπεύθυνου κυκλοφορίας	Προσθετικό (εμπωτική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση		Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες προνοιες	Διάρκεια εγκρίσης
						mg kg	kg πλήρους ζωοτροφής			
E 772	Eli Lilly and Company Ltd.	Ναραζίνη 80 g/kg - Νικαρβαζίνη 80 g/kg (Maxiban G 160)	Δραστική ουσία: Diclazuril, C ₁₇ H ₁₅ Cl ₃ N ₄ O ₂ , (±)-4-χλωροφαινυλ(2,6- διχλωρο-4-(2,3,4,5-τετραυδρο- 3,5-διοξυ-1,2,4-τριαζίν- 2-υλ)φαινυλ)ακετονιτρίλιο, Αριθ. CAS: 101831-37-2 Συγγενείς προσμεμίξεις: Προϊόν διάσπασης (R064318): ≤ 0,2% Λοιπές συγγενείς προσμεμίξεις: (R066891, R066896, R068610, R070156, R068584, R070016): ≤ 0,5% μεμονωμένως Σύνολο προσμεμίξεων: ≤1,5% Σύνθεση προσθετικού: Ναραζίνη: δραστικότητα 80 g/kg Νικαρβαζίνη: 80 g/kg Έλαιο σόγιας ή ορυκτό λάδι: 10-30 g/kg Βερμικουλίτης: 0-20 g/kg Μικροχλωθέντης F-Red: 11 g/kg Χονδράσεμένοι σπάδικες αραβοσίτου ή φασολι ρυζιού qs 1/kg	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	80	100	Απαγορεύεται η χορήγηση τουλάχισ- τον 5 ημέρες πριν από τη σφαγή.	30.9.2009	

Αριθμός Ε.Ε.	Επωνυμία και αριθμός καταχώρη- σης του υπεύθυνου κυκλοφορίας	Προσθετικό (εμπορική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση της δραστικής ουσίας/ kg πλήρους ζωοτροφής	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες προνόμιες	Διάρκεια έγκρισης
			Δραστική ουσία: α) Ναραζίνη, $C_{43}H_{72}O_{11}$, Αριθ. CAS: 55134-13-9, πολυαιθέρας μονοκαρβονικού οξέος, παραγόμενο από Streptomyces aureofaciens (NRRL 8092), σε κοκκώδη μορφή, δραστικότητα ναραζίνης Α: $\geq 85\%$ β) Νικαρβαζίνη, $C_{10}H_{18}N_6O_8$ Αριθ. CAS: 330-95-0 Ισομερικό σύμπλοκο 1,3-δης (4-νιτροφαινυλ) ουρίας και 4,6- διμεθυλοπυριμιδινόλης-2, σε κοκκώδη μορφή Συγγενείς προσμίξεις: π-νιτρο-ανιλίνη: $\leq 1\%$					Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να αναφέρουν: "Επικίνδυνο για τα ιπποειδή". "Η τροφή αυτή περιέχει προσθετικό της ομάδας των ιονοφόρων ή ταυτόχρονη χορήγησή της με ορισμένα φάρμακα (την ταμουλίνη, για παράδειγμα) μπορεί να αντενδείκνυται".	

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέντρωση mg/Kg πλήρους ζωοτροφής	Μέγιστη συγκέντρωση	Άλλες προνοιες	Διάρκεια έγκρισης
	Στ. Χρωστικές ουσίες							
	1. Καροτινοειδή και ξανθοφύλλες							
E 160c	Καψανθίνη	$C_{40}H_{56}O_3$	} Πουλερικά	-	-	80 για	-	Χωρίς χρονι- κό πε- ριορι- σμό
E 160e	β-απω-8'-καροτενάλη	$C_{30}H_{40}O$		-	-	ουσία μόνη	-	
E 160f	β-άπω καροτενοϊκός αιθυλεστέρ	$C_{32}H_{44}O_2$		-	-	της ή με άλλα καρο- τινοειδή και ξανθο- φύλλες	-	
E 161b	Λουτεΐνη (Ωχρίνη)	$C_{40}H_{56}O_2$	α) Πουλερικά β) Σολωμός ,πέστρες	-	-	80	Επιτρέπεται η χρήση μόνο μετά την ηλικία των ξέ- μηνων. Το μίγμα κανθαξανθι- νης με ασταξανθίνη επιτρέ- πεται με την προϋπόθεση ότι η συνολική συγκέντρωση του μίγματος δεν υπερβαίνει τα 100mg/Kg στις πλήρεις ζωοτροφές.	
E 161c	Κρυπτοξανθίνη	$C_{40}H_{56}O$		-	-	-	-	
E 161g	Κανθαξανθίνη	$C_{40}H_{52}O_2$		-	-	-	-	
			γ) Σκύλοι, γάτες και ψάρια ενυδρείου	-	-	-	-	
E 161h	Ζεαξανθίνη	$C_{40}H_{56}O_2$	Πουλερικά	-	-	80 για ουσία μόνη της ή με άλλα κα- ροτινοειδή και ξανθο- φύλλες	-	
E 161i	Κιτραξανθίνη	$C_{33}H_{44}O$	Όρνιθες ζωοκίας	-	-	-	-	

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέντρωση mg/Kg πλήρους ζωοτροφής	Μέγιστη συγκέντρωση mg/Kg πλήρους ζωοτροφής	Άλλες πρήνοες	Διάρκεια έγκρισης
E 161j	Ασταξανθίνη	$C_{40}H_{52}O_4$	α) Σολωμός, πέστροφες	-	-	100	Επιτρέπεται μόνο μετά την ηλικία των έξι μηνών. Το μίγμα κανθαξανθίνης με ασταξανθίνη επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι η συνολική συγκέντρωση του μίγματος δεν υπερβαίνει τα 100mg/Kg στις πλήρεις ζωοτροφές.	Χωρίς χρονικό πε- ριορισμό
E 102	2. Άλλες χρωστικές ύλες Ταρτραζίνη	$C_{16}H_8N_4O_6S_2Na_3$	β) Ψάρια ενυδρείου	-	-	-	-	
E 110	Κίτρινο-πορτοκαλί S (Sunset yellow FCE)	$C_{16}H_{10}N_2O_7S_2Na_2$	Ψάρια ενυδρείου	-	-	-	-	
E 124	Κόκκινο ponceau 4R	$C_{20}H_{11}N_2O_{10}S_3Na_3$		-	-	-	-	
E 127	Ερυθροσίνη	$C_{20}H_{14}O_5Na_2H_2O$	α) όλα τα είδη ή κατηγορίες ζώων εκτός από σκύλους και γάτους	-	-	-	Επιτρέπεται στις ζωοτροφές μόνο για επεξεργασμένα προϊόντα από: (i) Υποπροϊόντα τροφίμων, (ii) Μετουσιωμένα σιτηρά ή άλετρο κασάβας, ή (iii) Άλλες πρώτες ύλες μετουσιωμένες από αυτούς τους παράγοντες ή χρωματισμένες κατά την τεχνική επεξεργασία για διασφάλιση της αναγκασίας ταυτοποίησης	
E 131	Κυανούν πέντε V (Patent blue V)	Άλας ασβεστίου του ανυδρίτη του μ-υδροξυτετρακυλο-διαμινοφαινυλοκαρβινόλη δισουλφονικού οξέος		-	-	-	-	

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μένιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέντρωση mg/Kg πλήρους ζωτροφής	Μένιστη συγκέντρωση συγκέντρωση	Άλλες προνοιες	Διάρκεια έγκρισης
E 132	Ινδοκίνη	$C_{16}H_{18}N_2O_8S_2Na_2$	β) Σκύλοι, γάτοι	-	-	-	διάρκους της βιομη- χανοποίησης.	
E 141	Σύνπλοκο χαλκού- χλωροφύλλης		Ψάρια ενυδρείου	-	-	-	-	
E 142	Πράσινο όξινο λαμπρό BS (πράσινο λισσαμίνης) (Acid brilliant Green BS)		Ψάρια ενυδρείου Όλα τα είδη η κατηγορίες ζώων με εξάρτηση τους σκύλους, τους γάτους και τα ψάρια ενυδρείου.	-	-	-	Επιτρέπεται στις ζωτροφές μόνο για επεξεργασμένα προϊόντα από: (i) Υποπροϊόντα τροφίμων (ii) Μετουσιωμένα σιτηρά ή άλευρο κασάδας, ή (iii) άλλες πρώτες ύλες μετουσιωμένες από αυτούς τους παράγοντες ή χρωμα- τισμένες κατά την τεχνική επεξεργασία για διασφάλιση της αναγκαίας ταυτοποι- ησης διάρκους της βιομηχανοποίησης.	
E 153	Αιθόλη	C	β) Σκύλοι, γάτοι και ψάρια ενυδρείου Ψάρια ενυδρείου	-	-	-	-	
E 160	Βιξίνη (Bixine)	$C_{25}H_{40}O_4$		-	-	-	-	
E 172	Κόκκινο οξείδιο του σιδήρου	Fe_2O_3		-	-	-	-	

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέντρωση mg/kg πλήρους ζωοτροφής	Μέγιστη συγκέντρωση συγκέντρωση	Άλλες προνοιες	Διάρκεια έγκρισης
	3. Χρωστικές ουσίες που επιτρέπονται από τους κοινοτικούς κανονισμούς για το χρωματισμό των τροφίμων, εκτός από το Patent blue V και το πράσινο όξινο λαμπρό BS.	-	α) Όλα τα είδη ή κατηγορίες ζώων με εξάλειψη τους σκύλους και τους γάτους β) Σκύλοι, γάτοι	-	-	-	Επιτρέπεται στις ζωοτροφές μόνο για επεξεργασμένα προϊόντα από: (i) υποπροϊόντα τροφίμων ή (ii) άλλες πρώτες ύλες μετου- σιωμένες από αυτούς τους παράγοντες ή χρωματι- σμένες κατά την τεχνική επεξεργασία για εξα- σφάλση της αναγκαίας ταυτοποίησης διαρκούσης της βιομηχανοποίησης.	

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέντρωση mg/Kg πλήρους ζωτροφής	Μέγιστη συγκέντρωση ζωτροφής	Άλλες πρόνοιες	Διάρκεια έγκρισης
E 200	Ζ. Συντηρητικά Σορβικό οξύ	$C_6H_8O_2$	όλα τα είδη ή κατηγορίες ζώων	-	-	-	Όλες οι ζωτροφές	
E 201	Σορβικό νάτριο	$C_6H_7O_2Na$		-	-			
E 202	Σορβικό κάλιο	$C_6H_7O_2K$		-	-			
E 203	Σορβικό ασβέστιο	$C_{12}H_{14}O_4Ca$		-	-			
E 214	4-υδροξυβενζοϊκός αιθυλεστέρις	$C_8H_{10}O_3$	Ζώα συντροφιάς	-	-	-	Όλες οι ζωτροφές εκτός από μη επεξεργασμένο κρέας και ψάρια	
E 215	Το άλας νατρίου του 4-υδροξυβενζοϊκού αιθυλεστέριος	$C_8H_6O_3Na$		-	-			
E 216	4-υδροξυβενζοϊκός προπυλεστέρις	$C_{10}H_{12}O_3$		-	-			
E 217	Το άλας νατρίου του 4-υδροξυβενζοϊκού προπυλεστέριος	$C_{10}H_{11}O_3Na$		-	-			
E 218	4-υδροξυβενζοϊκός μεθυλεστέρις	$C_8H_8O_3$	Σκύλοι, γάτοι	-	-	Μαζί ή χωριστά 500, εκφρασμέ- νο σε SO_2		
E 219	Το άλας νατρίου του 4-υδροξυβενζοϊκού μεθυλεστέριος	$C_8H_7O_3Na$		-	-			
E 222	Όξινο θειώδες νάτριο	$NaHSO_3$		-	-			
E 223	Μεταδιθειώδες νάτριο	$Na_2S_2O_5$		-	-			

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη	Μέγιστη	Άλλες πρόνοιες	Διάρκεια έγκρισης	
					συγκέντρωση mg/Kg	συγκέντρωση ζωοτροφής			
E 236	Μυρμηγκικό οξύ	CH ₂ O ₂	Όλα τα είδη ή κατηγορίες ζώων	-	-	-	Να αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης: «Απαγορεύεται η χρήση του μυρμηγκικού οξέος μόνου ή όταν αντιπροσωπεύει περισσότερο από 50% κατά βάρος του μίγματος με άλλα οξέα για τη διατήρηση υπό όξινες και αερόβιες συνθήκες σιτηρών που έχουν υγρανθεί και δεν έχουν υποστεί επεξεργασία, τα οποία έχουν περιεκτικότητα σε υγρασία ανώτερη του 15%»	Χωρίς χρονικό περιο- ρισμό	
E 237	Μυρμηγκικό νάτριο	CHO ₂ Na	Όλα τα είδη ή κατηγορίες ζώων	-	-	-			
E 238	Μυρμηγκικό ασβέστιο	C ₂ H ₂ O ₄ Ca		-	-	-			
E 240	Φορμαλδεύδη	CH ₂ O	Αγελάδες, αιγοπρόβατα χοίροι	-	-	-			Όλες οι ζωοτροφές Σιτοί μόνο
E 250	Νιτρώδες νάτριο	NaNO ₂	Σκύλοι, γάτοι	6 μήνες	-	-			Υποκατάστατα γάλακτος μόνο: μέγιστη περιεκτικότητα 600mg/Kg
E 260	Οξικό οξύ	C ₂ H ₄ O ₂	Όλα τα είδη ή κατηγορίες ζώων	-	-	100			Εγκυτωμένες ζωοτροφές μόνο
E 261	Οξικό κάλι	C ₂ H ₃ O ₂ K		-	-	-			Όλες οι ζωοτροφές
E 262	Διοξικό νάτριο	C ₄ H ₇ O ₄ Na		-	-	-			
E 263	Οξικό ασβέστιο	C ₄ H ₆ O ₄ Ca		-	-	-			
E 270	Γαλακτικό οξύ	C ₃ H ₆ O ₃		-	-	-			

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέντρωση mg/Kg πλήρους ζωτροφής		Μέγιστη συγκέντρωση ζωτροφής	Άλλες πρήνοιες	Διάρκεια έγκρισης
E 280	Προπιονικό οξύ	$C_3H_6O_2$	Όλα τα είδη ή κατηγορίες ζώων	-	-	-	Όλες οι ζωτροφές		
E 281	Προπιονικό νάτριο	$C_3H_5O_2Na$		-	-	-			
E 282	Προπιονικό ασβέστιο	$C_6H_{10}O_4Ca$		-	-	-			
E 283	Προπιονικό κάλιο	$C_3H_5O_2K$		-	-	-			
E 284	Προπιονικό αμμώνιο	$C_3H_9O_2N$		-	-	-			
E 285	Μεθυλοπροπιονικό οξύ	$C_4H_8O_2$	Μηρυκαστικά από την ένορξη του μηρυκασμού	-	1000	4000	Όλες οι ζωτροφές		
E 295	Μυρμηγκικό αμμώνιο	CH_3O_2N	Όλα τα είδη ή κατηγορίες ζώων	-	-	-			
E 296	D,L-μηλικό οξύ	$C_4H_8O_5$		-	-	-			
E 297	Φουμαρικό οξύ	$C_4H_4O_4$		-	-	-			
E 325	Γαλακτικό νάτριο	$C_3H_5O_3Na$		-	-	-			
E 326	Γαλακτικό κάλιο	$C_3H_5O_3K$	Όλα τα είδη ή κατηγορίες ζώων	-	-	-			
E 327	Γαλακτικό ασβέστιο	$C_6H_{10}O_6Ca$		-	-	-			
E 330	Κιτρικό οξύ	$C_6H_8O_7$		-	-	-			
E 331	Άλατα νατρίου με κιτρικό οξύ	-		-	-	-			

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέντρωση mg/Kg πλήρους ζωοτροφής		Μέγιστη συγκέντρωση συγκέντρωση	Άλλες πρόνοιες	Διάρκεια έγκρισης
E 332	Άλατα καλίου με κιτρικό οξύ	-	Όλα τα είδη ή κατηγορίες ζώων	-	-	-	-	Όλες οι ζωοτροφές	
E 333	Άλατα ασβεστίου με κιτρικό οξύ	-		-	-	-	-		
E 334	L-τρουγικό οξύ	$C_4H_6O_6$		-	-	-	-		
E 335	Άλατα νατρίου με L-τρουγικό οξύ	-		-	-	-	-		
E 336	Άλατα καλίου με L-τρουγικό οξύ	-		-	-	-	-		
E 337	L-τρουγικό κάλιο νάτριο	$C_4H_4O_6KNa \cdot 4H_2O$		-	-	-	-		
E 338	Ορθοφωσφορικό οξύ	H_3PO_4	Σκύλοι Γάτες	-	-	-	-	Σίποι μόνο	
E 490	Προπανο-1,2-διόλη	$C_3H_8O_2$		-	-	-	53.000 75.000		
E 507	Υδροχλωρικό οξύ	HCl	Όλα τα είδη ή κατηγορίες ζώων	-	-	-	-		
E 513	Θειικό οξύ	H_2SO_4		-	-	-	-		

Αριθμός Ε.Ε.	Στοιχείο	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Μέγιστη περιεκτικότητα του στοιχείου σε mg/Kg πλήρους ζωτροφής	Άλλες πρόνοιες	Διάρκεια έγκρισης
Ε 1	Θ. Ιχθυοστοιχεία Σίδηρος - Fe	Ενυδρο χημικό σύμπλοκο σιδήρου-αμινοξέων	Fe(x) ₁₋₃ ·n H ₂ O (όπου x ανιόντα αμινοξέων παραγόμενων με υδρόλυση φυτικών πρωτεϊνών). Μοριακό βάρος μέχρι 1500.	1.250 (ολικό)	-	Επιτρέπεται μόνο: (i) στη μετουσιωμένη αποβουτυρωμένη ζωτοτροφές που παρασκευάζονται από μετουσιωμένη αποβουτυρωμένη γαλακτόσκινη υπό τον όρο: - Τήρηση των σχετικών διατάξεων των Κανονισμών (ΕΟΚ) αρ.368/77 & (ΕΟΚ)αρ.443/77 της Επιτροπής. - Δήλωσης στην ετικέτα, τη συσκευασία ή το δοχείο της μετουσιωμένης αποβου- τυρωμένης γαλακτόσκινος, της ποσότητας του προστεθέντος στοιχειακού σιδήρου. (ii) στις συνθετικές ζωτοτροφές εκτός των αναφερομένων στο (i).
		Ανθρακικός σίδηρος	FeCO ₃		-	
		Διχλωριούχος σίδηρος, τετραένυδρος	FeCl ₂ ·4H ₂ O		-	
		Τριχλωριούχος σίδηρος, εξαένυδρος	FeCl ₃ ·6H ₂ O		-	
		Κίτρικος σίδηρος, εξαένυδρος	Fe ₃ (C ₆ H ₅ O ₇) ₂ ·6H ₂ O		-	
		Φουμαρικός σίδηρος	FeC ₄ H ₂ O ₄		-	
		Γαλακτικός σίδηρος, τριένυδρος	Fe(C ₃ H ₅ O ₃) ₂ ·3H ₂ O		-	
		Τριοξείδιο του σιδήρου	Fe ₂ O ₃		-	
		Θειικός σίδηρος, μονοένυδρος	FeSO ₄ ·H ₂ O		-	
		Θειικός σίδηρος, επτά- ένυδρος	FeSO ₄ ·7H ₂ O		-	

Αριθμός Ε.Ε.	Στοιχείο	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Μέγιστη περιεκτικότητα του στοιχείου σε mg/Kg πλήρους ζωτροφής	Άλλες προνοιες	Διάρκεια έγκρισης
Ε 2	Ιώδιο- I	Ιωδικό ασβέστιο, εξα- ένυδρο	$\text{Ca}(\text{IO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	Ιπποειδή: 4 (ολικό) Ψάρια: 20 (ολικό) Άλλα είδη ή κατηγορίες ζώων: 10 (ολικό) 10 (ολικό)	-	
		Ιωδικό ασβέστιο, άνυδρο	$\text{Ca}(\text{IO}_3)_2$		-	
		Ιωδιούχο νάτριο	NaI		-	
		Ιωδιούχο κάλιο	KI		-	
Ε 3	Κοβάλτιο-Co	Οξικό κοβάλτιο, τετρα- ένυδρο	$\text{Co}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$		-	
		Βασικό ανθρακικό κοβάλτιο, ένυδρο	$2\text{CoCO}_3 \cdot 3\text{Co}(\text{OH})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$		-	
		Χλωριούχο κοβάλτιο, εξαένυδρο	$\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$		-	
		Θειικό κοβάλτιο, επτα- ένυδρο	$\text{CoSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$		-	
		Θειικό κοβάλτιο, μονο- ένυδρο	$\text{CoSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$		-	
		Νιτρικό κοβάλτιο, εξα- ένυδρο	$\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$		-	

Αριθμός Ε.Ε.	Στοιχείο	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Μέγιστη περιεκτικότητα του στοιχείου σε mg/kg πλήρους ζωτροφής	Άλλες προνοιες	Διάρκεια έγκρισης
Ε 4	Χαλκός-Cu	Οξικός χαλκός, μονοένυδρος	$\text{Cu}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$	Χοίροι παχυνόμενοι: -μέχρι 16 βδομάδες 175 (ολικός) -από 17 βδομάδες μέχρι σφαγής 35(ολικός) Χοίροι αναπαραγωγής: 35 (ολικός) Δαμάδια: - Υποκατάστατα γάλακτος: 30 (ολικός) - Λοιπές πλήρεις ζωτροφές 50 (ολικός) Πρόβατα: 15 (ολικός) Άλλα είδη ή κατηγορίες ζώων: 35 (ολικός) Χοίροι παχυνόμενοι: - Μέχρι 16 βδομάδες: 175 (ολικός) - Από 17 βδομάδες μέχρι σφαγής: 35 (ολικός) Χοίροι αναπαραγωγής: 35 (ολικός) Πρόβατα: 15 (ολικός) Άλλα είδη ή κατηγορίες ζώων εξαιρουμένων των δαμάλων: 35 (ολικός)	- - - - - - Μετουσιωμένη αποβουτυρωμένη γαλακτόσκη και σύνθετες ζωτροφές παρασκευαζόμενες από μετουσιωμένη αποβουτυρωμένη γαλακτόσκη υπό τον όρο: Τήρησης των σχετικών διατάξεων των Κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 368/77 και (ΕΟΚ) αριθ.443/77 της Επιτροπής. - Δήλωσης στην επικέτα, τη συσκευασία ή το δοχείο της μετουσιωμένης αποβουτυρωμένης γαλακτόσκης, της ποσότητας, του προστεθέντος στοιχειακού χαλκού.	
		Βασικός ανθρακικός χαλκός, μονοένυδρος	$\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$			
		Χλωριούχος χαλκός, διένυδρος	$\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$			
		Μεθειονικός χαλκός	$\text{Cu}(\text{C}_2\text{H}_5\text{NO}_2\text{S})_2$			
		Οξείδιο του χαλκού	CuO			
		Θειικός χαλκός, πενταένυδρος	$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$			
		Θειικός χαλκός, μονοένυδρος	$\text{Cu SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	Χοίροι παχυνόμενοι: - Μέχρι 16 βδομάδες: 175 (ολικός) - Από 17 βδομάδες μέχρι σφαγής: 35 (ολικός) Χοίροι αναπαραγωγής: 35 (ολικός) Πρόβατα: 15 (ολικός) Άλλα είδη ή κατηγορίες ζώων εξαιρουμένων των δαμάλων: 35 (ολικός)	Μετουσιωμένη αποβουτυρωμένη γαλακτόσκη και σύνθετες ζωτροφές παρασκευαζόμενες από μετουσιωμένη αποβουτυρωμένη γαλακτόσκη υπό τον όρο: Τήρησης των σχετικών διατάξεων των Κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 368/77 και (ΕΟΚ) αριθ.443/77 της Επιτροπής. - Δήλωσης στην επικέτα, τη συσκευασία ή το δοχείο της μετουσιωμένης αποβουτυρωμένης γαλακτόσκης, της ποσότητας, του προστεθέντος στοιχειακού χαλκού.	
		Θειικός χαλκός, πενταένυδρος	$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$			

Αριθμός Ε.Ε.	Στοιχείο	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Μέγιστη περιεκτικότητα του στοιχείου σε mg/Kg πλήρους ζωτροφής	Άλλες προνοιες	Διάρκεια έγκρισης
Ε 5	Μαγγάνιο-Mn	Χαλκική χηλική ένωση αμινοξέων, ενυδατωμένη	$\text{Cu}(\text{x})_{1,3} \cdot \text{nH}_2\text{O}$ (x =ανιόν κάθε αμινοξέος παράγωγου πρωτεϊνών σάβας που έχουν υπο- βληθεί σε ηλεκτρόλυση)	Χοίροι παχυνόμενοι: - Μέχρι 16 βδομάδες 175 (ολικός) - Από 17 βδομάδες μέχρι σφαγής 35 (ολικός) Χοίροι αναπαραγωγής: 35 (ολικός) Άλλα είδη ή κατηγορίες ζώων, εκτός από τα δαμά- λια προτού αρχίσουν να μηρυκάζουν και τα πρόβατα: 35 (ολικός) 250 (ολικός)	Κατ' ανώτατο όριο 20 mg χαλκού/kg πλήρους ζωτροφής επιτρέπεται να προέχονται από χαλκική χηλική ένωση αμινοξέων ενυδατωμένη.	Χωρίς χρονικό περιο- ρισμό
		Ανθρακικό μαγγάνιο	MnCO_3		-	
		Χλωριούχο μαγγάνιο, τετραένυδρο	$\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$		-	
		Μανόξινο φωσφορικό μαγγάνιο, τριένυδρο	$\text{MnHPO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$		-	
		Οξείδιο του μαγγανίου	MnO		-	
		Τριοξείδιο του μαγγανίου	Mn_2O_3		-	
		Θειικό μαγγάνιο, τε- τραένυδρο	$\text{MnSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$		-	
		Θειικό μαγγάνιο, μο- νόενυδρο	$\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$		-	

Αριθμός Ε.Ε.	Στοιχείο	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Μέγιστη περιεκτικότητα του στοιχείου σε mg/Kg πλήρους ζωστροφής	Άλλες προνοιες	Διάρκεια έγκρισης
Ε 6	Ψευδάργυρος-Zn	Μαγγανική χηλική ένωση αμινοξέων, ενυδατωμένη	$Mn(x)_{1,3} \cdot nH_2O$ (x=ανιόν κάθε αμινοξέος παράγωγου πρωτεϊνών σάκχας που έχουν υποβληθεί σε υδρόλυση) Μοριακό βάρος μικρότερο από 1500	250 (ολικός)	Κατ' ανώτατο όριο 40 mg μαγγανίου/kg πλήρους ζωστροφής επιτρέπεται να προέρχονται από μαγγανική χηλική ένωση αμινοξέων, ενυδατωμένη.	Χωρίς χρονικό περιορισμό
		Γαλακτικός ψευδάργυρος, τριένυδρος	$Zn (C_3H_5O_3)_2 \cdot 3H_2O$			
		Οξικός ψευδάργυρος, διένυδρος	$Zn(CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O$			
		Ανθρακικός ψευδάργυρος	$ZnCO_3$			
		Χλωριούχος ψευδάργυρος, μονοένυδρος	$ZnCl_2 \cdot H_2O$			
		Οξείδιο του ψευδαργύρου	ZnO			
		Θειικός ψευδάργυρος, επταένυδρος	$ZnSO_4 \cdot 7H_2O$			
		Θειικός ψευδάργυρος, μονοένυδρος	$ZnSO_4 \cdot H_2O$			
					Μέγιστη περιεκτικότητα σε μόλυβδο 600mg/Kg.	

Αριθμός Ε.Ε.	Στοιχείο	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Μέγιστη περιεκτικότητα του στοιχείου σε mg/Kg πλήρους ζωτροφής	Άλλες πρόνοιες	Διάρκεια έγκρισης
Ε 7	Μολυβδαίνιο-Mo	Χηλική ένωση αμινοξέων ψευδαργύρου ενυδατω- μένη	$Zn(x)_{1,3} \cdot nH_2O$ (x=ανιόν κάθε αμινοξέος παράγωγου πρωτεϊνών σάβας που έχουν υπο- βληθεί σε υδρόλυση) Μοριακό βάρος μικρότερο από 1500	2,5 (ολικό)	Κατ' ανώτατο όριο 80 mg ψευδαργύρου/kg πλήρους ζωτροφής επιτρέπεται να προ- έρχονται από χηλική ένωση αμινοξέων ψευδαργύρου, ενυδατωμένη	Χωρίς χρονικό περιο- ρισμό
		Μολυβδαινικό αρμόνιο Μολυβδαινικό νάτριο	$(NH_4)_6Mo_7O_{24} \cdot 4H_2O$ $Na_2MoO_4 \cdot 2H_2O$			
Ε 8	Σελήνιο-Se	Σεληνιώδες νάτριο Σεληνικό νάτριο	Na_2SeO_3 Na_2SeO_4	0,5 (ολικό)	- - - -	

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέντρωση mg/Kg πλήρους ζωτροφής	Μέγιστη συγκέντρωση	Άλλες προνοιες	Διάρκεια έγκρισης
E 330	<u>ΙΒ. Συνδετικές, αντιοξειδωτικές και πηκτικές ουσίες</u> Κίτρινο οξύ	C ₆ H ₈ O ₇	Όλα τα είδη ή κατηγορίες ζώων	-	-	-	Όλες οι ζωτροφές. Τήρηση των διατάξεων του Παραρτήμα- τος 3, παράγραφος 2, υποπαρά- γραφος(1) (α), των παρόντων κανονισμών	Χωρίς χρονικό περιο- ρισμό
E 470	Στεατικό νάτριο, κάλι και ασβέστιο	C ₁₈ H ₃₅ O ₂ Na C ₁₈ H ₃₅ O ₂ K και C ₃₆ H ₇₀ O ₄ Ca Μέγιστη συγκέντρωση διοξίνης: ⁽¹⁾		-	-	-		
E 516	Θειικό ασβέστιο διένυδρο	CaSO ₄ ·2H ₂ O Μέγιστη συγκέντρωση διοξίνης: ⁽¹⁾		-	-	30.000		
E 551a	Πυρρικό οξύ, μετά από καθίζηση και ξήρανση	-		-	-	-		
E 551b	Κολλοειδές πυρρικό	Μέγιστη συγκέντρωση διοξίνης: ⁽¹⁾		-	-	-		
E 551c	Γη διατόμων, εξα- γνισμένη(Kieselguhr)			-	-	-		
E 552	Συνθετικό πυρρικό ασβέστιο	-		-	-	-		
E 554	Συνθετικό πυρρικών αργίλιο νάτριο	Μέγιστη συγκέντρωση διοξίνης: ⁽¹⁾		-	-	-		

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέντρωση mg/kg πλήρους ζωοτροφής	Μέγιστη συγκέντρωση συγκέντρωση	Άλλες προνοίες	Διάρκεια έγκρισης
Ε 558	Μπεντονίτης/μοντο- ριλλονίτης	- Μέγιστη συγκέντρωση διοξίνης: ⁽¹⁾	Όλα τα είδη ή κατηγορίες ζώων	-	-	20,000	Όλες οι ζωοτροφές. Απαγορεύεται η ανάμιξη με προσθετικά των ομάδων των αντιβιοτικών, ουσιών που πράγουν την ανάπτυξη και κοκκιδιοστατικών και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών εκτός από τα εξής: Μονενσινικό νάτριο, ναραζίνη, λασалоσινικό νάτριο, φλαβο- φωσφολιπόλη, σαλινομυκινικό νάτριο, νικαρμπαζίνη, ρομπεν- τίνη Να αναφέρεται στη συσκευασία το συγκεκριμένο όνομα του προσθετικού.	Χωρίς χρονικό περιο- ρισμό
Ε 559	Καολινικοί άργιλλοι, απαλλαγμένοι αμιάντου	Φυσικώς απαντώντα μίγματα ορυκτών που περιέχουν τουλά- χιστο 65% σύμπλοκα ενυδατω- μένα πυριτικά αργίλια με κύριο συστατικό τους τον καολινίτη. Μέγιστη συγκέντρωση διοξίνης: 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg ⁽²⁾	Όλα τα είδη ή κατηγορίες ζώων	-	-	-	Όλες οι ζωοτροφές	Χωρίς χρονικό περιο- ρισμό
Ε 560	Φυσικό μίγμα στεα- τινη και χλωρίτη απαλ- λαγμένο από αμίαντο	Φυσικά μίγματα στεατίτη και χλωρίτη χωρίς αμίαντο. Ελά- χιστη καθαρότητα μίγματος: 85%.	Όλα τα είδη ή κατηγορίες ζώων	-	-	-	Όλες οι ζωοτροφές	Χωρίς χρονικό περιο- ρισμό

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέντρωση mg/kg πλήρους ζωοτροφής	Μέγιστη συγκέντρωση	Άλλες πρόνοιες	Διάρκεια έγκρισης
Ε 561	Βερμικουλίτις	Φυσικά πυριτικά άλατα μαγνησίου, αργιλίου και σιδήρου, διογκωμένα με θέρμανση, χωρίς σμίλντο. Μέγιστη συγκέντρωση φθορίου: 0,3%.	Όλα τα είδη ή κατηγορίες ζώων	-	-	-	Όλες οι ζωοτροφές	Χωρίς χρονικό περιο- ρισμό
Ε562	Σεπιολίτις(Σεπιολίθος)	Μέγιστη συγκέντρωση διοξίνης: ⁽¹⁾ Ένυδρο πυριτικό μαγνήσιο ορυ- κτής προέλευσης περιεκτικότητας τουλάχιστο 60% σε σεπιολίτη και το πολύ 30% μοντοριλλανίτη. Απαλλαγμένο από σμίλντο.		-	-	20.000		
Ε 563	Σεπιολιθική άργυλος	Ένυδρο πυριτικό μαγνήσιο ορυκτής προέλευσης που περιέχει τουλάχιστο: κατά 40% σεπιολίτη και 25% ιλλίτη. Απαλλαγμένο από σμίλντο.		-	-	20.000		
Ε 565	Λιγνοσουλφονικά (Λιγνοθεϊικά άλατα)	Μέγιστη συγκέντρωση διοξίνης: ⁽¹⁾		-	-	-		
Ε566	Νατρολίτις-φονόλιθος	Φυσικό μίγμα αργυλοπυριτικών αλάτων και αλκαλικών γαϊών και ένυδρου πυριτικού ασβεστίου, νατρολίθου (43-46.5%) και αστρίου Μέγιστη συγκέντρωση διοξίνης: ⁽¹⁾		-	-	25.000		

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέντρωση mg/kg πλήρους ζωοτροφής	Μέγιστη συγκέντρωση	Άλλες προνοιες	Διάρκεια εγκρίσης
E 598	Συνθετικά αργιλικά ασβέστια	Μίγματα αργιλικών ασβεστίων που περιέχουν από 35-51% Al ₂ O ₃ . Μέγιστη περιεκτικότητα σε μολυβδαίνιο: 20mg/kg Μέγιστη συγκέντρωση διοξίνης: ⁽¹⁾	Πουλερικά, κουνέλια χοίροι. Αγελάδες αρμεγόμενες, βοοειδή παχυνόμενα, δαμάδια, αρνιά, ρίφια	- - -	- - -	20.000 8.000 -	Όλες οι ζωοτροφές	Χωρίς χρονικό περιο- ρισμό
E 599	Περλίτης	Φυσικό πυριτικό άλας νατρίου και αργιλίου, διογκωμένο με θέρμανση. Απαλλαγμένο από ομίαντο.	Όλα τα είδη ή κατηγορίες ζώων	-	-	-		

(1) 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg

(2) Η περιεκτικότητα σε διοξίνες είναι το σύνολο των πολυχλωριωμένων διβενζο-παρα-διοξινών (PCDD) και πολυχλωριωμένων διβενζοφουρανίων (PCDF), εκφραζόμενο σε τοξικά ισοδύναμα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO), εφαρμόζοντας τους TEF-WHO (συντελεστές τοξικής ισοδυναμίας, 1997).

Η περιεκτικότητα πρέπει να εκφράζεται από το ανώτερο όριο, δηλαδή υπολογίζεται με την παραδοχή ότι όλες οι τιμές των διαφόρων συγγενών στοιχείων κάτω από το όριο ανίχνευσης εξισώνονται με το όριο ανίχνευσης.

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέντρωση mg/Kg πλήρους ζωοτροφής	Μέγιστη συγκέντρωση συγκέντρωση	Άλλες προνοίες	Διάρκεια έγκρισης
E1600	ΙΔ. Ένζυμο 3-φυτάση EC 3.1.3.8	Παρασκευάσμα 3-φυτάσης παραγόμενο από <i>Aspergillus niger</i> (CBS 114.94) με ελάχιστη δραστικότητα: Στερεά μορφή: 5 000 FTU/g ⁽¹⁾ Υγρή μορφή: 5 000 FTU/ml	Χοιρίδια	2 μήνες	500 FTU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προ- μύγατος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα έναντι του σχηματισμού συσφαιρωμάτων 2. Συνιστώμενη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 500 FTU 3. Για χρήση στις σύνθετες ζωοτροφές με συγκέντρωση πλέον του 0,23% σε φυτικά φωσφορικά άλατα	Χωρίς χρονικό περιο- ρισμό
			Χοίροι παχυνόμενοι	-	280 FTU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμι- γματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα έναντι του σχηματισμού συσφαιρωμάτων 2. Συνιστώμενη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 400-500 FTU	

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέντρωση mg/Kg πλήρους ζωοτροφής	Μέγιστη συγκέντρωση συγκέντρωση	Άλλες πρόνοιες	Διάρκεια έγκρισης
							3. Για χρήση στις σύνθετες ζωοτροφές με συγκέντρωση πλέον του 0,23 % σε φυτικά φωσφορικά άλατα	Χωρίς χρονικό περιο- ρισμό
			Χοιρομητέρες	-	375 FTU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμι- γματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα έναντι του σχηματισμού συσφαιρωμάτων	
			Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	375 FTU	-	2. Συνιστώμενη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής 500 FTU	
							3. Για χρήση στις σύνθετες ζωοτροφές με συγκέντρωση πλέον του 0,36 % σε φυτικά φωσφορικά άλατα	
							1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμι- γματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα έναντι σχημα- τισμού συσφαιρωμάτων	

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέντρωση mg/kg πλήρους ζωοτροφής	Μέγιστη συγκέντρωση συγκέντρωση	Άλλες προνοιες	Διάρκεια έγκρισης
							2. Συνιστώμενη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 500-700 FTU 3. Για χρήση στις σύνθετες ζωοτροφές με συγκέντρωση πλέον του 0,23 % σε φυτικά φωσφορικά άλατα 1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμιγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα έναντι σχηματισμού συσφαιρωμάτων 2. Συνιστώμενη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 300-400 FTU 3. Για χρήση στις σύνθετες ζωοτροφές με συγκέντρωση πλέον του 0,23 % σε φυτικά φωσφορικά άλατα	Χωρίς χρονικό περιορισμό

(1) 1 FTU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμόμοριο ανόργανου φωσφορικού άλατος από φυτικό νάτριο ανά λεπτό υπό pH 5,5 και σε θερμοκρασία 37° C.

Αριθμός Ε.Ε.	Προσβετικ.ό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέντρωση mg/Kg πλήρους ζωοτροφής	Μέγιστη συγκέντρωση	Άλλες πρόνοιες	Διάρκεια έγκρισης
Ε 1700	ΙΕ. Μικροοργανισμοί Bacillus licheniformis (DSM 5749) Bacillus subtilis (DSM 5750) Σε αναλογία 1/1	Μίγμα Bacillus licheniformis και Bacillus subtilis που περι- έχει κατ'ελάχιστο $3,2 \times 10^9$ CFU/g του προσβετικού ($1,6 \times 10^9$ CFU/g από κάθε βακτήριο)	Χοιρίδια	2 μήνες	$1,28 \times 10^9$	$3,2 \times 10^9$	Στις οδηγίες χρήσης του προσβετικού και του προμηνματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμψηξη.	Χωρίς χρονικό περιο- ρισμό

ΠΙΝΑΚΑΣ II

(Παράγραφος 5)

ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β, ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 15, ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΕΧΕΙ

ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Πρώτη Τροποποίηση που αφορά : Δ. Ουσίες προάγουσες την ανάπτυξη, Ε. Ένζυμα, ΙΕ. Μικροοργανισμούς

Αριθμός Ε.Ε.	Επωνυμία και αριθμός καταχώρησης του υπεύθυνου κυκλοφορίας	Προσθετικό (εμπορική ονομασία)	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέν- τρωση		Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες προνοιες	Διάρκεια έγκρισης
						Μονάδες δραστικού- τητας/kg πλήρους ζωοτροφής				
1	Norsk Hydro Ltd	A. Αντιβιοτικά B. Αντιοξειδωτικά Γ. Κοκκιδιοστατικά και λοιπές φαρμακευτικές Ουσίες	Σύνθεση προσθετικού: Διμυρμηγικό κάλιο, στερεό 98 g/100 g, Πυρρικό άλας 1,5 g/100 g, Νερό 0,5 g/100 g Δραστική ουσία: Διμυρμηγικό κάλιο, στερεό, KH(COOH) ₂ Αριθ. CAS:20642-05-1	Χοιρίδια	2 μηνών	6000	6000	6000	-	30.6.2005

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέντρωση	Μέγιστη συγκέντρωση	Άλλες προνοιες	Διάρκεια έγκρισης
					Μονάδες δραστικότητας/kg πλήρους ζωοτροφής			
11	Ε. Ένζυμα Ενδο-1,4-β-γλυκανάση EC 3.2.1.4 Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC 3.2.1.6. Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC 3.2.1.8	Παρασκευάσματα ενδο-1,4-β-γλυκανάσης, ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσης και ενδο-1,4-β-ξυλανάσης που παράγονται από το <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 74252) που παρουσιάζουν ελάχιστη δραστικότητα: κοκκώδης και υγρή μορφή: Ενδο-1,4-β-γλυκανάση: 8000 U ⁽¹⁾ /g ή ml Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 18000 U ⁽²⁾ /g ή ml Ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 26000 U ⁽³⁾ /g ή ml	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	Ενδο-1,4-β-γλυκανάση: 400 U Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 900 U Ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 1300 U	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμηνματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη. 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,4-β-γλυκανάση: 400-1600 U Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 900-3600 U Ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 1300-5200 U 3. Για χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και β-γλυκάνες), π.χ. που περιέχουν περισσότερο από 30% σπύρι ή κριθάρι και περισσότερο από 10% σίκαλη.	30.6.2004

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες πρόνοιες	Διάρκεια εγκρίσης
					Μονάδες δραστικό- τητας/kg πλήρους ζωοτροφής			
(1)	1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 0,1 μικρογραμμολόγια γλυκόζης από καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη						ανά λεπτό σε pH5.0 και 40° C.	
(2)	1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 0,1 μικρογραμμολόγια γλυκόζης από β-γλυκάνη κριθαριού						ανά λεπτό σε pH5.0 και 40° C.	
(3)	1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 0,1 μικρογραμμολόγια γλυκόζης από ξυλάνη περικαρτίου βρώμης						ανά λεπτό σε pH5.0 και 40° C.	
		Γάλοι παχυνόμενοι			Ενδο-1,4-β- γλυκανάση: 400 U Ενδο- 1,3(4)-β- γλυκανάση: 900 U Ενδο-1,4-β- ξυλανάση: 1300 U		1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του τροφίμου πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη. 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,4-β- γλυκανάση: 400-800 U Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 900-1800 U Ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 1300-2600 U 3. Για χρήση στις σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοζυλάνες και β-γλυκάνες) π.χ. που περιέχουν περισσότερο από 40% σιτάρι.	31.5.2005

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες προνοιες	Διάρκεια εγκρίσις
					Μονάδες δραστικό- τητας/kg πλήρους ζωοτροφής			
23	Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC 3.2.1.8	Παρασκευάσμα Ενδο-1,4-β- ξυλανάσης που παράγεται από <i>Trichoderma</i> <i>longibrachiatum</i> (CNCM, MA 6-10 W) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Στερεά μορφή: 70000 IFP ⁽¹⁾ /g Υγρή μορφή: 7000 IFP/ml	Γάλοι παχυνόμενοι	-	700 IFP	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρα- σία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη. 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 1400 IFP 3. Για χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβι- νοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40% σιτάρι 28.2.2005	28.2.2005
			Όρνιθες ωοτοκίας	-	840 IFP	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρα- σία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 840 IFP 28.2.2005	28.2.2005

⁽¹⁾ 1 IFP είναι η ποσότητα ενζύμων που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο αναγωγικών σακχάρων (ισοδυναμίων ξυλόζης) από ξυλάνη βρύμης ανά λεπτό σε pH4,8 και 50° C.

⁽¹⁾ 1 IFP είναι η ποσότητα ενζύμων που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο αναγωγικών σακχάρων (ισοδύναμων ξυλολόζης) από ξυλάνη βρώμης ανά λεπτό σε pH 4,8 και 50° C.

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέν- τρωση	Μέγιστη συγκέν- τρωση	Άλλες προνοιες	Διάρκεια έγκρισης
					Μονάδες δραστηκό- τητας/kg πλήρους ζωοτροφής			
27	Ενδο-1,4 β-ξυλανάση EC 3.2.1.8	Παρασκευάσμα ενδο-1,4-β- ξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma reesei (CBS 529.94) και ενδο- 1,3(4)-β-γλυκανάσης που παράγεται από Trichoderma reesei (CBS 526.94) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Στερεά μορφή: 200000 BXU ⁽¹⁾ /g 200000 B U ⁽²⁾ /g Υγρή μορφή: 30000 BXU/g 30000 BU/g	Χοιρδία	2 μήνες	7500 BXU 7500 BU	- -	3. Για χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αιγύλου (κυρίως αρβινο- ξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40% σιτάρι 1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμینگματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρα- σία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη. 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 7500-15000 BXU 7.500-15000 BU 3. Για χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολύσακχαρίτες εκτός αιγύλου (κυρίως β-γλυκά- νες και αρβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50% σιτάρι	28.2.2005
	Ενδο-1,3(4)-β- γλυκανάση EC 3.2.1.6.							

(1) 1 BXU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 0,06 μικρογραμμολόγια αναγωγικών σακχάρων (ισοδύναμων ξυλόζης) από ξυλάνη σημύδας ανά λεπτό σε pH 5,3 και 50° C.

(2) 1 BU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 0,06 μικρογραμμολόγια αναγωγικών σακχάρων (ισοδύναμων γλυκόζης) από β-γλυκάνη κριθαριού ανά λεπτό σε pH 4,8 και 50° C.

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέν- τρωση		Μέγιστη συγκέν- τρωση	Άλλες προνοίες	Διάρκεια εγκρίσης
					Μονάδες δραστικό- τητας/kg πλήρους ζωοτροφής				
28	3-φυτάση EC 3.1.3.8	Παρασκεύασμα 3-φυτάσης που παράγεται από Trichoderma reesei (CBS 528.94) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Στερεά μορφή: 5000 PPU ⁽¹⁾ /g Υγρή μορφή: 1000 PPU/g	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	500 PPU	-		1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμιγνύματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρα- σία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη. 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 500-750 PPU 3. Για χρήση στις σύν- θετες ζωοτροφές δηλα- δή που περιέχουν πάνω από 0,22% φυτικά φωσφορικά άλατα	28.2.2005

(¹) 1 PPU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο ανόργανου φωσφορικού άλατος από φυτικό νάτριο ανά λεπτό σε pH5,0 και 37° C:

(1) 1 PPU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμολόμιο ανόργανου φωσφορικού άλατος από φυτικό νάτριο ανά λεπτό σε pH5,0 και 37° C.

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέν- τρωση	Μέγιστη συγκέν- τρωση	Άλλες προνοιες	Διάρκεια εγκρίσης
						Μονάδες δραστικό- τητας/kg πλήρους ζωοτροφής		
30	Ενδο-1,3(4)β- γλυκανάσχη EC 3.2.1.6 Ενδο-1,4β-ξυλανάσχη EC 3.2.1.8	Παρασκευάσματα ενδο-1,3(4)- β-γλυκανάσχη και ενδο-1,4- β-ξυλανάσχη που παράγεται από <i>Penicillium funiculosum</i> (IMI SD 101) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Μορφή σκόνης: Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσχη: 2000 U ⁽¹⁾ /g Ενδο-1,4-β-ξυλανάσχη: 1400 U ⁽²⁾ /g Υγρή μορφή: Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσχη: 500 U/ml Ενδο-1,4-β-ξυλανάσχη: 350 U/ml	Γάλα παχυνόμενοι	-	Ενδο- 1,3(4)-β- γλυκανάσχη: 100 U Ενδο- 1,3(4)-β- ξυλανάσχη 70U	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρα- σία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ξυδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-β-γλυκα- νάσχη: 100 U Ενδο-1,4-β- ξυλανάσχη: 70 U 3. Για χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινο- ξυλάνες και β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50% σιτάρι	28.2.2005

⁽¹⁾ 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 5,55 μικρογραμμολόγια αναγωγικών σακχάρων (ισοδύναμων μαλτόζης) από β-γλυκάνη κριθαριού ανά λεπτό σε pH 5,0 και 50°C.

⁽²⁾ 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 4,00 μικρογραμμολόγια αναγωγικών σακχάρων (ισοδύναμων μαλτόζης) από ξυλάνη σημύδας ανά λεπτό σε pH 5,5 και 50°C.

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέντρωση	Μέγιστη συγκέντρωση	Άλλες προνοιες	Διάρκεια έγκρισης
					Μονάδες δραστη- τητας/kg πλήρους ζωοτροφής	Μονάδες δραστη- τητας/kg πλήρους ζωοτροφής		
			Όρνιθες ωοακίας	-	Ενδο- 1,3(4)-β- γλυκανά- ση: 100 U Ενδο-1,3 (4)-β-ξυλα- νάση: 70U	- -	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανά-ση: 100 U Ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 70 U 3. Για χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως β-γλυκά-νες και αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 60% κριθάρι ή 30% σιτάρι	28.2.2005
			Χοίροι παχυνόμενοι	-	Ενδο- 1,3(4)-β- γλυκανά- ση: 100 U	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη	28.2.2005

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συνέ- νωση	Μέγιστη συνέ- νωση	Άλλες προνοιες	Διάρκεια εγκρισης
					Μονάδες δραστικό- τητας/kg πλήρους ζωοτροφής			
51.	Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC 3.2.1.8	Παρασκευασμα από ενδο- 1,4-β-ξυλανάση που παράγεται από τον <i>Bacillus subtilis</i> (LMG S-15136) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα 100 IU ⁽¹⁾ /g	Χοιρίδια	2 μήνες	Ενδο-1,3 (4)-β-ξυ- λανάση: 70 U	-	2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 100 U Ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 70 U 3. Για χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσάκχαριτες εκτός αμύλου (κυρίως β-γλυκά- νες και αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50% κριθάρι ή 60% σιτάρι 1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμύγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρα- σία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη. 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 10 IU 3. Για χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε αραβινοξυλάνη, π.χ. που περιέχουν περισσότερο από 40% σιτάρι	31.5.2005

⁽¹⁾ 1 IU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει ένα μικρογραμμομόριο αναγωγικών σακχάρων (ισοδύναμων ξυλόζης) από ξυλάνη σημύδας ανά λεπτό σε pH4,5 και 30°C.

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες προνοιες	Διάρκεια έγκρισης
59	Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC 3.2.1.8 Ενδο-1,3(4)-β- γλυκανάση EC 3.2.1.6 Σουμπτιλίνη EC 3.4.21.62 Α-αμυλάση EC 3.2.1.1 Πολυγαλακτουρονάση EC 3.2.1.15	Παρασκευάσμα ενδο-1,4-β- ξυλανάση που παράγεται από <i>Trichoderma</i> <i>longibrachiatum</i> (ATCC 2105). Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσης και αμυλάσης που παράγεται από <i>Bacillus amy-</i> <i>loliquefaciens</i> (DSM 9553), σουλπιλιδίνης που παράγεται από <i>Bacillus</i> <i>subtilis</i> (ATCC 2107), και πολυγαλακτουρονάσης που παράγεται από <i>Aspergillus</i> <i>aculeatus</i> (CBS 589.94) παρουσιάζουν ελάχιστη δραστικότητα: Ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 300 U ⁽¹⁾ /g Ενδο-1,3(4)- β-γλυκανάση: 150 U ⁽²⁾ /g Σουλπιλιδίνη: 4000 U ⁽³⁾ /g Α-αμυλάση: 400 U ⁽⁴⁾ /g Πολυγαλακτουρονάση: 25 U ⁽⁵⁾ /g	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	Ενδο-1,4-β- ξυλανάση: 300 U, Ενδο-1,3 (4)-β-γλυ- κανάση: 150 U, Σουλπι- λιδίνη: 4000 U, Α-αμυλάση 400 U, Πολυγαλα- κτουρονά- ση: 25 U	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμυλματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρα- σία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη. 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 300 U Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 150 U Σουλπιλιδίνη: 4000 U Α-αμυλάση: 400 U Πολυγαλακτουρονάση: 25 U 3. Για χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβι- νοξυλάνες και β-γλυκά- νες), δηλαδή που περι- έχουν πάνω από 40% ααβδόσιτο.	28.2.2005

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες προνοιες	Διάρκεια εγκρίσης
					Μονάδες δραστικό- τητας/kg πλήρους ζωοτροφής			
60	Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC 3.2.1.8 Ενδο-1,3(4)-β- γλυκανάση EC 3.2.1.6	Παρασκευάσμα ενδο-1,4-β- ξυλανάσης που παράγεται από <i>Trichoderma</i> <i>longibrachiatum</i> (ATCC 2105), ενδο-1,3(4)-β- γλυκανάσης που παράγεται από <i>Trichoderma</i> <i>longibrachiatum</i> (ATCC 2106) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 5000 U ⁽¹⁾ /ml Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 50 U ⁽²⁾ /ml	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	Ενδο-1,4-β- ξυλανάση :500 U, Ενδο- 1,3(4)-β- γλυκανά- ση: 5 U	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρα- σία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα σύμπτυξης. 2. Ενδεχόμενη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 500-2500 U Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 5-25 U 3. Για χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως β-γλυκά- νες και αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 20% κριθάρι και 40% σιτάρι	28.2.2005

(1) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο αναγωγικών σακχάρων (ισοδύναμων ξυλόζης) από ξυλάνη περικαρπίου βρώμης σε pH5,3 και 50° C.

(2) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο αναγωγικών σακχάρων (ισοδύναμων γλυκόζης) από β-γλυκάνη κριθαριού ανά λεπτό σε pH5,0 και 30° C.

(3) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο φαινολικής ένωσης (ισοδύναμων τυροσίνης) από υπόστρωμα καζέινης ανά λεπτό σε pH7,5 και 40° C.

(4) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο γλυκοσιδικών δεσμών από αδιάλυτο στο νερό αμυλούχο σταυροπολυμερές ανά λεπτό σε pH6,5 και 37° C.

(5) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο αναγωγικών υλών (ισοδύναμων καλακτουρονικού οξέος) από πολυ-Δ-γαλακτουρικό υπόστρωμα ανά λεπτό σε pH5,0 και 40° C.

(¹) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο αναγωγικών σακχάρων (ισοδύναμων ξυλόζης) από ξυλάνη περικαρπίου βρώμης σε pH5,3 και 50° C.
 (²) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο αναγωγικών σακχάρων (ισοδύναμων γλυκόζης) από β-γλυκάνη κριθαριού ανά λεπτό σε pH5,0 και 30° C.
 (³) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μίκρογραμμομόριο φαινολικής ένωσης (ισοδύναμων τυροσίνης) από υπόστρωμα καζένης ανά λεπτό σε pH7,5 και 40° C.
 (⁴) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο γλυκοσιδικών δεσμών από αδιάλυτο στο νερό αμυλούχο σταυροπολυμερές ανά λεπτό σε pH6,5 και 37° C.
 (⁵) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο αναγωγικών υλών (ισοδύναμων καλακτουρονικού οξέος) από πολυ-Δ-γαλακτουρικό υπόστρωμα ανά λεπτό σε pH5,0 και 40° C.

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση	Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες πρόνοιες	Διάρκεια εγκρίσης
					Μονάδες δραστικό- τητας/kg πλήρους ζωοτροφής			
61	Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC 3.2.1.8 Ενδο-1,3(4)-β- Γλυκανάση EC 3.2.1.8.	Παρασκευάσμα ενδο-1,3(4)- β-ξυλανάσης, που παράγεται από Trichoderma reesei (CBS 529.94), και Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσης που παράγεται από Trichoderma reesei (CBS 526.94) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Μορφή σκόνης: Ενδο-1,3(4)-β-ξυλανάση: 17000 BXU ⁽¹⁾ /g Ενδο-1,4-β-γλυκανάση: 11000 BU ⁽²⁾ /g Υγρή μορφή: Ενδο-1,3(4)-β-ξυλανάση: 22.000 BXU/g Ενδο-1,4-β-γλυκανάση: 15000 BU/g	Κοτόπουλα παχυνόμενα	-	Ενδο- 1,4- β-ξυλανά- ση: 17000 BXU Ενδο- 1,3(4)-β- γλυκα- νάση: 11000 BU	-	1. Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμιγνύματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρα- σία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 17000 BXU Ενδο-1,3-β-γλυκανάση: 11000 BU 3. Για χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινο- ξυλάνες και β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40% κριθάρι και 55% σιτάρι	28.2.2005

(¹) 1 BXU είναι ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 0,06 μικρογραμμομόρια αναγωγικών σακχάρων (ισοδύναμων ξυλόζης) από ξυλάνη κριθαρίου ανά λεπτό, σε pH 5,3 και 50° C.
(²) 1 BU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 0,06 μικρογραμμομόρια αναγωγικών σακχάρων (ισοδύναμων γλυκόζης) από β-γλυκάνη κριθαρίου ανά λεπτό, σε pH 4,8 και 50° C.

(¹) 1 BXU είναι ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 0,06 μικρογραμμομόρια αναγωγικών σακχάρων (ισοδύναμων ξυλόζης) από ξυλάνη σημύδας ανά λεπτό, σε pH 5,3 και 50° C.

(²) 1 BU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 0,06 μικρογραμμομόρια αναγωγικών σακχάρων (ισοδύναμων γλυκόζης) από β-γλυκάνη κριθαριού ανά λεπτό, σε pH 4,8 και 50° C.

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζύων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση CFU/ kg πλήρους ζωοτροφής		Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Άλλες προνοιες	Διάρκεια έγκρισης
3	Στ. Μικροοργανισμοί Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47	Παρασκεύασμα του Saccharomyces cerevisiae που περιέχει τουλάχιστο 5 x 10 ⁹ CFU/g προσθετικού	Αγελάδες αρμεγόμενες	-	4 x 10 ⁹	2 x 10 ⁹		Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμήγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία απο- θήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη Η ποσότητα του Saccharomyces cerevisiae στην καθημερινή μερίδα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5,6 x 10 ⁹ CFU ανά 100 kg σωματικού βάρους. Προσθέστε 8,75 x 10 ⁹ για κάθε επιπλέον 100 kg σωματικού βάρους	31.5.2005
5	Saccharomyces cerevisiae CBS 493.24	Παρασκεύασμα του Saccharomyces cerevisiae που περιέχει τουλάχιστο 1 x 10 ⁹ CFU/g προσθετικού	Αγελάδες αρμεγόμενες	-	5 x 10 ⁷	3,5 x 10 ⁸		Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμήγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη	31.5.2005

Αριθμός Ε.Ε.	Προσθετικό	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση CFU/ kg πλήρους ζωοτροφής		Άλλες προνοιες	Διάρκεια εγκρίσης
					Μέγιστη συγκέ- ντρωση	Ελάχιστη συγκέ- ντρωση		
20	Bacillus licheniformis (DSM 5749) Bacillus subtilis (DSM 5750) (Σε αναλογία 1/1)	Μίγμα Bacillus licheniformis και Bacillus subtilis που περιέχει κατ' ελάχιστον: 3.2×10^8 CFU/g προσθετικού (1.6×10^8 CFU/g κάθε βακτηριδίου)	Δαμάδια	6 μήνες	1.28×10^8	1.6×10^8	Η ποσότητα του Saccharomyces cerevisiae στην καθημερινή μερίδα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 1.2×10^8 CFU ανά 100 kg σωματικού βάρους. Προσθέστε 1.7×10^8 CFU για κάθε επιπλέον 100 kg σωματικού βάρους Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμηνμάτος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη	28.2.2005
21	Enterococcus faecium DSM 3530	Παρασκεύασμα Enterococcus faecium που περιέχει τουλάχιστο 2.5×10^9 CFU/g προσθετικού	Δαμάδια	6 μήνες	1×10^8	1×10^8	Στις οδηγίες χρήσης του προσθετικού και του προμηνμάτος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπτυξη	